BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO:
99
mg/dL
Valor de
Referência:
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES (2º e 3º TRIMESTRE DE GESTACAO):
Menor que 92 mg/dL
1º trimestre de gestacao: seguir os valores de referencia para a populacao geral
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional. As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia a Glicose (TOTG), entre a 24a e 28a semanas de gestaçao, com 75 gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos:Jejum, 1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga. Um ou mais valores alterados determinam o diagnostico de diabetes gestacional.
Nota: O achado de glicemia casual (sem cumprir o tempo exigido para o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico. Neste caso, tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra, num dia subsequente.
Fonte: ADA (American Diabetes Association). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standands of Medical care in Diabetes - 2019.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

09/12/22
08:11:59
05/09/23
08:11:11
0
50
100
150
200
250 168
99

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
168
mg/dL
VR:
Valores Referenciais Desejáveis (com ou sem Jejum):
Para adultos acima de 20 anos: Inferior a 190 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes: Inferior a 170 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota:
A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação
do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento
das metas terapêuticas.
"Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou
maior ou igual a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de
Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML;
SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
COLESTEROL NAO HDL:
134
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico solicitante
para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 160
Risco Intermediário...Inferior a 130
Risco Alto .....Inferior a 100
Risco Muito Alto.....Inferior a 80
NOTA:
O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico,
recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no
Colesterol Total e HDL Colesterol.
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberação:
05/09/2023 -
13:23:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL HDL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
34
mg/dL
VR:
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos Acima de 20 anos:
Com ou Sem Jejum: Superior a 40 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
Com ou Sem Jejum: Superior a 45 mg/dL
Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil
Lipidico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberação:
05/09/2023 - 13:23:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
163
mg/dL
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos acima de 20 anos:
Com Jejum de 12 horas: Inferior a 150 mg/dL
Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas: Inferior a 175 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
De 0 a 9 Anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 75 mg/dL
(Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 85 mg/dL
De 10 a 19 anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 90 mg/dL
((Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 100 mg/dL
* A interpretação clínica dos resultados devrá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
* Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de variação Biológica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberação:
05/09/2023 -
13:23:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
1,56
mg/dL
Valor de
Referencia :
HOMENS INFERIOR A 50 ANOS 0,84 A 1,25 mg/dL
HOMENS SUPERIOR A 50 ANOS 0,81 A 1,44 mg/dL
MULHERES 0,66 A 1,09 mg/dL
RECEM NASCIDOS 0,5 A 1,2 mg/dL
INFANTIL 0,4 A 0,7 mg/dL
CRIANCA 0,5 A 1,2 mg/dL
ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRACAO
GLOMERULAR(eTFG)
55
ml/min/1,73 m2
Valor de
Referencia :
SE AFRO-BRASILEIRO
ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRACAO
GLOMERULAR(eTFG)
47
ml/min/1,73 m2
Valor de
Referencia :
SE CAUCASIANO
Adulto a partir de 18 anos.....: acima de 60 ml/min/1,73 m
Pacientes menor de 18 anos.....: Nao-Aplicavel
Nota:De acordo com as recomendacoes da SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia
) e do NKDEP (National Kidney Disease Education Program - EUA), a partir de 22/03/2016,
estamos fornecendo a estimativa da taxa de filtracao glomerular
G), pela formula do grupo americano CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiol
ogy Collaboration), para adultos a partir dos 18 anos de idade.
Atencao: A e TFG apresenta algumas restricoes e deve ser desconsiderada nas se
guintes situacoes que alteram a producao basal de creatinina: gestantes; comor
bidade graves; pacientes hospitalizados; extremos de peso ou massa muscular; o
besidade ou desnutricao graves; amputados; paraplegicos; doencas musculo-esque
leticas; dieta vegetariana estrita; suplementos alimentares a base de creati
na; mudancas bruscas na funcao renal.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
0
0,5
1

1,5
2 1,30
1,56

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Erro Total Permitido.....: 8,87%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:31

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,4
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
20/07/15
08:27:00
23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
3
4
5
6
7
4,2 4,3
4,7 4,1
4,7 4,4

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
7,6
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 3,5 A 7,2 mg/dL
MULHERES 2,6 A 6,0 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido urico
abaixo de 6 mg/dL.
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
2
4
6
8
10
6,8
7,6

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
33
U/L
Valor de referência:
HOMEM (ADULTOS) INFERIOR A 50 U/L
MULHER (ADULTOS) INFERIOR A 35 U/L
RECEM NASCIDOS 25 A 75 U/L
INFANTIL 15 A 60 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
0
20
40
60
80
100
45 33

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
48
U/L
Valor de
Referencia :
HOMEM (ADULTOS) INFERIOR A 50 U/L
MULHER (ADULTOS) INFERIOR A 35 U/L
RECEM NASCIDOS/CRIANCA COM MENOS DE 7 ANOS 13 A 45 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
0
50
100
150
91
48

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CPK CREATINO FOSFOQUINASE
Material :
Soro
Metodo :
UV Otimizado -IFCC
RESULTADO
158
U/L
Valor de
Referencia :
HOMENS MENOR OU IGUAL A 171 U/L
MULHERES MENOR OU IGUAL A 145 U/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 22,8%
Erro Total Permitido: 30,3%
FONTE: James Westgard - EUA
OBS: O exercicio fisico e injecoes intra musculares interferem elevando
a dosagem da CPK.
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
05/09/2023 - 13:23:30

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
0
500
1.000
1.500
143 158

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2023-09-05 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGLOBINA GLICADA
Material:
Sangue Total
Metodo:
HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
RESULTADO:
6,40
%
Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus:
- Inferior a 5,7%.....: baixo risco de diabetes
- Entre 5,7 a 6,4%.....: risco aumentado para diabetes
- Superior ou igual a 6,5%: consistente com diabetes*
* Na ausência de hiperglicemia comprovada, o resultado deve ser confirmado com a repetição do teste em uma nova amostra.
Nota: O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada está certificado pelo NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program -
USA. A meta a ser alcançada no nível de hemoglobina glicada para o efetivo controle do diabetes mellitus deve ser inferior a 7% em adultos e de 7,5% a 8,5% em idosos, conforme recomendação da American Diabetes Association - ADA.
Atenção: Visando facilitar a interpretação clínica do resultado de HbA1c, a American Diabetes Association - ADA recomenda o cálculo da Glicemia Média Estimada
(GME) que converte os valores de HbA1c em valores médios de glicose, refletindo os níveis glicêmicos dos noventa dias anteriores a coleta na mesma unidade de medida da glicemia (mg/dL).
- Ponto de corte para o diagnóstico do pré-diabetes: GME entre 117 e 140 mg/dL
- Ponto de corte para o diagnóstico do diabetes....: GME superior a 140 mg/dL
Referências:
- SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes: Posicionamento Oficial n° 02/2017;
- SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.
GME
136.98
mg/dL
VR:
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
05/09/2023 - 08:11:11
Data/Hora Liberacao:
06/09/2023 - 10:28:41