


# Síntesis de Dilantin un antiepiléptico a partir de benzaldehído

Andrés Perez<sup>†</sup>, Juan Barbosa<sup>‡</sup>

Departamento de Química. <sup>†</sup> Departamento de Ing. Química. <sup>‡</sup> Departamento de Física. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

## ABSTRACT:

La síntesis de la 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona (*Dilantin*) se realiza en 3 etapas a partir del benzaldehído. El primero corresponde con una condensación benzoínica, el segundo es la oxidación de la benzoína y finalmente se lleva a cabo un rearrreglo benzílico para dar origen al compuesto hidantoínico. Las últimas dos etapas son realizadas con dos metodologías distintas, la primera novedosa y la segunda clásica, usando cerca de la mitad de la benzoína sintetizada cada una. Los rendimientos obtenidos por las dos rutas son \_\_\_% y \_\_\_% correspondientemente. Siendo la ruta clásica más apropiada en términos de rendimiento y pureza, sin embargo la más demandante en tiempo. Se presentan los mecanismos de las distintas etapas de la reacción y su respectivo análisis.



## INTRODUCCIÓN


Los compuestos de la familia de las hidantoínas son importantes medicamentos debido a su alta actividad biológica en el sistema nervioso central. A pesar que su principal uso es como antiepiléptico, también es ampliamente usado como agente antiarrítmico, antitumor, bactericida y fungicida [1][2][3].



Esquema 1. Anillo de hidantoína.

La primera síntesis de la 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona (*Dilantin*) fue en 1908 por el químico alemán Heinrich Biltz, el cual trabajó con varias hidantoínas [3][4]. Desde entonces se han propuesto distintos métodos de síntesis entre los cuales se encuentran: en fase sólida, one-pot, en pasos múltiples y asistido por ultrasonido [1]. La ruta sintética usada comercialmente es el tratamiento de benzofenona con cianuro de potasio acuoso y carbonato de amonio [3]. El procedimiento experimental usado en la presente síntesis fue realizado en tres pasos divididos en la síntesis de la benzoína, la oxidación de la misma para obtener benzil, y finalmente el rearrreglo benzílico.

La obtención de la benzoína se realizó con una condensación benzoínica en presencia de cianuro de sodio. La oxidación de la misma se llevó a cabo usando dos métodos distintos, el primero propuesto por Depreux [5] en donde el cobre actúa como catalizador de la reacción, y el segundo donde se usa ácido nítrico. El último paso de la reacción usa los mismos reactivos para ambos métodos, con la diferencia que el primero es asistido por ultrasonido y el segundo se lleva a cabo en reflujo [1].



Esquema 2. Síntesis del Dilantin con las dos rutas seguidas en el laboratorio.

## ■ RESULTADOS Y DISCUSIÓN

## ■ CONCLUSIONES

## ■ SECCIÓN EXPERIMENTAL

Para la elucidación estructural de los productos se usa información espectroscópica de resonancia magnética nuclear protónica de 400 MHz proveniente de un RMN Bruker \_\_\_\_\_. El tetrametilsilano es usado como referencia interna, y cloroformo deuterado como solvente para todas las muestras. Adicionalmente se usan los puntos de fusión de los productos obtenidos.

### Síntesis de benzoína

En balón de reacción fueron adicionados 7.0 mL de benzaldehído sin destilar (68.6 mmol), junto con 6.5 mL de etanol absoluto y 5.0 mL de una solución acuosa de cianuro de sodio 2.0 M. Una trampa de bicarbonato de sodio en solución es usada para evitar la protonación del cianuro. La reacción se lleva a reflujo por 40 minutos. El producto es filtrado y recristalizado en 65 mL de etanol.

### Oxidación con acetato de cobre

La oxidación de la benzoína se lleva a cabo usando 1.5004 g de acetato de cobre en 8.0 mL de una solución ácido acético y agua (3/1 v/v). Los reactivos se agregan al balón de reacción y se lleva a reflujo en dos etapas de 20 minutos cada una. El producto se filtra y se purifica por columna usando fase móvil \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

### Oxidación con ácido nítrico

Una solución de 4.3 mL de ácido acético en 6.4 mL de ácido nítrico se adiciona a un balón de reacción con 0.846 g de benzoína. El mismo se lleva a reflujo con una trampa de bicarbonato. La reacción tiene una duración de 2 horas y 30 minutos. Posterior a este tiempo se enfría la solución y se agregan 50 mL de agua fría y se agita hasta la formación de cristales. El producto se filtra al vacío y se seca en horno.

### Síntesis de Dilantin asistido por ultrasonido

En un tubo de ensayo se adicionan 0.228 g de urea junto con 0.688 g de benzil. Los sólidos se disuelven en 5.0 mL de etanol absoluto. Posteriormente se adicionan \_\_\_\_ mL de una solución 0.57 M de hidróxido de potasio. La reacción se lleva a cabo en un sonicador a temperatura ambiente por 20 minutos. Una semana después se acidifica el producto con ácido clorhídrico concentrado, con la adición de agua se da la formación de precipitado. El mismo es filtrado al vacío y secado en horno.

## ■ REFERENCIAS

- [1] Javad Safari, Naimeh Moshtael Arani, and Anousheh Ramezan Isfahani. Ultrasound-enhanced green synthesis of 5, 5-diphenylhydantoin derivatives using symmetrical or unsymmetrical benzils. *Chinese Journal of Chemistry*, 28(2):255–258, 02 2010.
- [2] Gulce Ogruc Ildiz, Ismail Boz, and Ozan Unsalan. Ftir spectroscopic and quantum chemical studies on hydantoin. *Optics and Spectroscopy*, 112(5):665–670, 05 2012.
- [3] Rodney C. Hayward. Synthesis of the anticonvulsant drug 5, 5-diphenylhydantoin: An undergraduate organic chemistry experiment. *Journal of Chemical Education*, 60(6):512, 06 1983.
- [4] Jean Aicardi and Marc A. Dichter. *Epilepsy: A comprehensive textbook: Integrated content Website*. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2 edition, 09 2007.
- [5] P. Depreux, G. Bethegnies, and A. Marcincal-Lefebvre. Synthesis of benzil from benzoin with copper(ii) acetate. *Journal of Chemical Education*, 65(6):553, 06 1988.

## ■ INFORMACIÓN DE SOPORTE

