


Molly CNV hit (dir (1,rho), rho 0.585, tau free)
latent (no SE noise); AIC −16.0, LOO 6.5, P(hit|G=23) 0.88




with locus SE noise; AIC −16.0, LOO 6.5, P(hit|G=23) 0.88




Jon hit but rho fixed 0.585
latent (no SE noise); AIC −8.3, LOO 0.7, P(hit|G=23) 0.77




with locus SE noise; AIC −8.3, LOO 0.7, P(hit|G=23) 0.77




Jon hit but dir fixed (1,rho)
latent (no SE noise); AIC −8.0, LOO 0.6, P(hit|G=23) 0.83




with locus SE noise; AIC −8.0, LOO 0.6, P(hit|G=23) 0.83




Jon hit but tau free
latent (no SE noise); AIC −24.9, LOO 11.1, P(hit|G=23) 0.86




with locus SE noise; AIC −24.9, LOO 11.1, P(hit|G=23) 0.86




Jon single hit, joint (free dir, rho free, tauU, tau = 0)
latent (no SE noise); AIC −22.6, LOO 4.9, P(hit|G=23) 0.35




with locus SE noise; AIC −22.6, LOO 4.9, P(hit|G=23) 0.35



Continuous, free dir, rho free, tauU free
latent (no SE noise); AIC −18.8, LOO 8.4



with locus SE noise; AIC −18.8, LOO 8.4



hit not hit asymmetric mirror unclassified continuous