

# **Part I**

## **高等数学**



# Chapter 1

## 函数、极限、连续

### 1.1 考点解析

### 1.2 经典例题

例 1. (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$

$$\begin{aligned} \text{sol} &= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (\cos x - 1)]^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} \\ &= \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\ln(1+x^2)} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

(2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - \sqrt{x}})$

$$\begin{aligned} \text{sol} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x - \sqrt{x}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} + \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}}} = 1 \end{aligned}$$

例 2. (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{a}{x} - \left( \frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$ ,  $a$  为常数。

$$\begin{aligned} \text{sol} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + \ln(1 + ax)}{x^2} + a^2 \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + ax) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \frac{a}{1+ax}}{2x} + a^2 \lim_{x \rightarrow 0} ax = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2}{2(1 + ax)} + 0 = \frac{1}{2}a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{2 \sin x}}{x^3} \\
 \text{sol} = & \lim_{x \rightarrow 0} e^{2 \sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x - 2 \sin x} - 1}{x^3} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \sin x}{x^3} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x - 2 \cos x}{3x^2} & \text{or} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x (\cos x - 1)}{x^3} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \sin 2x + 2 \sin x}{6x} & = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{2 \sin x \frac{1}{2} x^2}{x^3} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8 \sin 2x + 2 \cos x}{6} & = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin x}{x} \\
 = & -1 & = -1
 \end{aligned}$$

例 3. (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$

$$\begin{aligned}
 \text{sol} = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e}{x} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1}{x} e = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x} e \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} e = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} e \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2(1+x)} e = -\frac{1}{2} e
 \end{aligned}$$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - x^x}{1 - x + \ln x}$

$$\begin{aligned}
 \text{sol} = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^{(x-1)}}{1 - x + \ln x} \lim_{x \rightarrow 1} x = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - e^{(x-1) \ln x}}{1 - x + \ln x} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1) \ln x}{1 - x + \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{\ln x + \frac{x-1}{x}}{-1 + \frac{1}{x}} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{1} = 2
 \end{aligned}$$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

$n \rightarrow +\infty$  是  $x \rightarrow +\infty$  的特殊情况, 将  $n$  换为  $x$ , 有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \tan \frac{1}{x})^{x^2}$ ,  
 $x \rightarrow +\infty$  求极限不方便, 倒代换  $t = \frac{1}{x}$ ,

$$\text{sol} \xrightarrow{t=\frac{1}{x}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{\tan t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} = \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\frac{\tan t}{t})}{t^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\frac{\tan t}{t} - 1 + 1)}{t^2} = \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\tan t}{t} - 1}{t^2} \\
&= \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan t - t}{t^3} = \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}}{3t^2} \\
&= \exp \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2}{3t^2} = e^{\frac{1}{3}}
\end{aligned}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \ln(1-x)$$

$$\begin{aligned}
&\text{sol} \xrightarrow{\ln(1-x) \sim -x} \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0
\end{aligned}$$

$$\text{例 4. (1) } \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x)]$$

sol : 看  $e^x$  不顺眼, 换

1°

$$\begin{aligned}
&\xrightarrow{t=e^x \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln t - (1 + t^{-1}) \ln(1 + t)] \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln t - \ln(1 + t) - \frac{\ln(1 + t)}{t}] \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln \frac{t}{1 + t} - \frac{\ln(1 + t)}{t}] \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{\frac{1}{t} + 1} - \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+t}}{1} \\
&= 0 - 0 = 0
\end{aligned}$$

2°

$$\begin{aligned}
&\xrightarrow{t=e^{-x} \rightarrow 0^+} \lim_{t \rightarrow 0^+} [-\ln t - (1 + t) \ln(1 + t^{-1})] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} [-\ln t - \ln(1 + \frac{1}{t}) - t \ln(1 + \frac{1}{t})] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} [-\ln(t + 1)] - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \frac{1}{t})}{\frac{1}{t}} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} [-\ln(t + 1)] - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-\frac{1}{t^2}}{1 + \frac{1}{t}}}{-\frac{1}{t^2}} \\
&= 0 - 0 = 0
\end{aligned}$$

3° 或恒等变换

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(1 + e^x)] - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln e^x - \ln(1 + e^x)] - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1 + e^x}{e^x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{e^x}{1+e^x}}{e^x} \\
 &= 0 - 0 = 0
 \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$$

遇绝对值，分左右极限。

sol

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{2e^{-\frac{4}{x} + e^{-\frac{3}{x}}}}{e^{-\frac{4}{x} + 1}} + 1 \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$$

$\therefore$  原式 = 1

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{sol} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{1}{x}}{2} \\
 &= \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{例 5. (1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$$

$$\text{sol} = \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\frac{\pi}{2} - \arctan x)}{\ln x} = \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{(1+x^2)(\frac{\pi}{2} - \arctan x)}$$

1°

$$= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x}}{(\frac{1}{x^2} + 1)(\frac{\pi}{2} - \arctan x)}$$

$$= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x}$$

$$= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}$$

$$= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x^2}{1+x^2} = e^{-1}$$

2°

$$\begin{aligned} &= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x}}{(1+\frac{1}{x^2})(\frac{\pi}{x} - \arctan x)} \\ &= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \\ &= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{1+x^2}} = e^{-1} \end{aligned}$$

3°

$$\begin{aligned} &= \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) - 1} \\ &\xrightarrow{\text{先求}} \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = 1 \\ &\therefore \exp \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2-1} = e^{-1} \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos x}{\sqrt{1-x}-\cos \sqrt{x}}$$

$$\begin{aligned} \text{sol} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-x} \cos x}{1-x-\cos^2 \sqrt{x}} \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-x} + \cos \sqrt{x}}{1+\cos x} \frac{\sin^2 x}{1-x-\cos^2 \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{2} \frac{x^2}{\sin^2 \sqrt{x} - x} \\ &\xrightarrow{t=\sqrt{x}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{t^4}{\sin^2 t - t^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2t^3}{\sin t \cos t - t} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6t^2}{\cos^2 t - \sin^2 t - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3t^2}{-\sin^2 t} \\ &= -3 \end{aligned}$$

例 6. 已知  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 6x^4 + 2)^\alpha - x] = \beta$ , 求  $\alpha, \beta$  的值。

$$\begin{aligned} \text{sol: } & \because \lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 6x^4 + 2)^\alpha - x] = \beta \\ & \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^\alpha - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[ \frac{(x^5 + 7x^4 + 2)^\alpha}{x} - 1 \right] = 0 \\ & \text{即 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^5 + 7x^4 + 2}{x^{\frac{1}{\alpha}}} \right)^\alpha = 1 \\ & \therefore \frac{1}{\alpha} = 5 \Rightarrow \alpha = 5 \end{aligned}$$

$$\text{又 } \because \beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[5]{x^5 + 7x^4 + 2} - x)$$

1°

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt[5]{x^5 + 7x^4 + 2} - 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1}{5} \left( \frac{7}{x} + \frac{2}{x^5} \right) = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

2°

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{t=\frac{1}{x} \rightarrow 0^+} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \sqrt[5]{\frac{1}{t^5} + \frac{7}{t^4} + 2} - \frac{1}{t} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} (\sqrt[5]{1 + 7t + 2t^5} - 1) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{5} (7t + 2t^5) = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

例 7. 设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内可导,  $f(x) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  且  $\lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}}$ , 求  $f(x)$ 。

$$\begin{aligned} \text{sol: } & \because \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}} \\ & \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{f(x+hx)}{f(x)}}{h} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

1° “+1-1” 法

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{f(x+hx)-f(x)}{f(x)} + 1 \right)}{h} = \frac{1}{x}$$



$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+hx) - f(x)}{hf(x)} &= \frac{1}{x} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+hx) - f(x)}{hx} &= \frac{1}{x^2} f(x) \\ f'(x) &= \frac{1}{x^2} f(x) \\ \therefore f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

2°

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{h} &= \frac{1}{x} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{hx} \cdot x &= \frac{1}{x} \\ x \cdot [\ln f(x)]' &= \frac{1}{x} \\ \therefore (\ln f(x))' &= \frac{1}{x^2} \\ \ln f(x) &= -\frac{1}{x} \\ f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

3° 泰勒展开法

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \\ \therefore f(x + \Delta x) &= f(x) + f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \\ \therefore \ln f(x + hx) &= \ln f(x) + [\ln f(x)]'hx + o(hx) \\ \text{则 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + hx) - \ln f(x)}{h} &= \frac{1}{x} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\ln f(x)]'hx + o(hx)}{h} &= \frac{1}{x} \\ [\ln f(x)]' &= \frac{1}{x^2} \\ \therefore f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

例 8. 设  $f(x)$  在  $x=0$  处可导,  $f(0) \neq 0$ ,  $f'(0) \neq 0$ , 当  $h \rightarrow 0$  时,  $af(h) + bf(2h) - f(0)$  是比  $h$  更高阶的无穷小, 求  $a, b$  的值。

$$\text{sol: } \because \lim_{h \rightarrow 0} af(h) + bf(2h) - f(0) = 0$$

并且  $f(x)$  在  $x=0$  可导,  $\rightarrow$  连续, 代入

$$af(0) + bf(0) - f(0) = 0$$

$$(a + b - 1)f(0) = 0$$

$$a + b = 1$$

回代

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) + bf(2h) - (a+b)f(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} a \frac{f(h) - f(0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} 2b \frac{f(2h) - f(0)}{2h} \\ &= af'(0) + 2bf'(0) = 0 \\ &\therefore \begin{cases} a + b = 1 \\ a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

例 9. 设  $f(x)$  为连续函数,  $f(0) \neq 0$ , 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt}$ 。

sol :

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \int_0^x f(t)dt - xf(x)}{xf(x) + \int_0^x f(t)dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{xf(x) + \int_0^x f(t)dt} \end{aligned}$$

1°

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}}{f(x) + \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}} \\ &\text{先计算 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ &= f(0) \\ \therefore \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0)}{f(x) + f(0)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2° 泰勒展开

$$\text{设 } F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

$$\begin{aligned}
F(x) &= F(0) + F'(0)x + o(x) \\
&= 0 + f(x)x + o(x) \\
\therefore \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{xf(x) + F(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + o(x)}{xf(x) + xf(x) + o(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \frac{o(x)}{x}}{2f(x) + \frac{o(x)}{x}} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例 10. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$  与  $ax^n$  为等价无穷小, 求常数  $a$  与  $n$  的值。

sol : 泰勒展开

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \\
\therefore 1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \\
&= 1 - [1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)][1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2)][1 - \frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2)] \\
&= (\frac{1}{2} + \frac{4}{2} + \frac{9}{2})x^2 + o(x^2) \\
&= 7x^2 + o(x^2) \\
&\therefore \text{与 } ax^n \text{ 等价无穷小} \\
&\therefore n = 2, a = 7
\end{aligned}$$

例 11. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $x^2 + \ln(1+x)\ln(1-x)$  与  $ax^n$  为等价无穷小, 求常数  $a$  与  $n$  的值。

sol : 泰勒展开

$$\begin{aligned}
\ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \\
\therefore x^2 + \ln(1+x)\ln(1-x) \\
&= x^2 + [x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)][-x - \frac{1}{2}(-x)^2 + \frac{1}{3}(-x)^3 - o(x^3)] \\
&= x^2 - [x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)][x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)] \\
&= (-\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4})x^4 + o(x^4)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{5}{12}x^4 + o(x^4) \\
&\because \text{与 } ax^n \text{ 等价无穷小} \\
&\therefore n = 4, a = -\frac{5}{12}
\end{aligned}$$

例 12. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$ , ( $a^2 + c^2 \neq 0$ ), 则 ( )  
 A.  $b = 4d$     B.  $b = -4d$     C.  $a = 4c$     D.  $a = -4c$

sol :

1° 洛必达

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \frac{1}{\cos^2 x} + b \sin x}{c \frac{-2}{1-2x} + d 2x e^{-x^2}} = \frac{a}{-2c} = 2 \Rightarrow a = -4c$$

2°

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \frac{\tan x}{x} + b \frac{\ln(1 - \cos x)}{x}}{c \frac{\ln(1 - 2x)}{x} + d \frac{1 - e^{-x^2}}{x}} = \frac{a}{-2c} = 2 \Rightarrow a = -4c$$

例 13. 设  $f(x)$  对一切正数  $x_1, x_2$  有  $f(x_1, x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ , 且  $f(x)$  在  $x = 1$  处连续, 证明  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  连续。

sol : 取  $x_1 = x_2 = 1 \Rightarrow f(1) = f(1) + f(1) \Rightarrow f(1) = 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f\left[x\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right]$$

$$= \lim_{\Delta x} \left[ f(x) + f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \right]$$

$\because f(x)$  在  $x = 1$  处连续

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) = f(1) = 0$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + 0] = f(x)$$

$\therefore f(x)$  在  $(0, +\infty)$  连续

例 14. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导,  $f(0) < 0$ ,  $f'(x) \geq k > 0$ , ( $k$  为常数), 证明方程  $f(x) = 0$  在  $(0, +\infty)$  上有唯一根。

sol : 构造  $F(x) = f(x) - f(0) - kx$

$$F'(x) = f'(x) - k \geq 0$$

又  $\because F(0) = 0$   
 $\therefore F(x) \geq F(0) = 0$   
 $\therefore f(x) \geq f(0) + kx$   
 $\therefore$  当  $f(0) + kx_0 = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{f(0)}{k} > 0$  时  $f(-\frac{f(0)}{k}) \geq 0$   
 且  $f(0) < 0, f'(x) \geq k > 0$   
 $\therefore f(x) = 0$  在  $(0, +\infty)$  上有唯一根

例 15. 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上二阶可导,  $f(a) < 0, f'(a) > 0$  当  $x > a$  时,  $f''(x) > 0$ , 证明方程  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  上存在唯一根。

sol  $\because f''(x) > 0$   
 $\therefore$  当  $x \in (a, +\infty)$  时  $f'(x) > f'(a)$   
 构造  $F(x) = f(x) - f(a) - f'(a)x$   
 $F'(x) = f'(x) - f'(a) > 0 \quad (x \in (a, +\infty))$   
 $\therefore f(x) - f(a) - f'(a)x > -f'(a)a$   
 $f(x) > f(a) + f'(a)x = f'(a)a$   
 令  $f(a) + f'(a)x_0 - f'(a)a = 0 \Rightarrow x_0 = a - \frac{f(a)}{f'(a)} > a$   
 $\therefore f(x_0) > 0$   
 又  $\because f(a) < 0, f'(x) > f'(a) > 0$   
 $\therefore f(x) = 0$  在  $(a, +\infty)$  上存在唯一根

例 16. 设  $x_1 > 0$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ ,  $a$  为正常数, 证明数列  $\{x_n\}$  存在极限并求其极限。

sol  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$   
 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{a}$   
 $\therefore x_{n+1} - x_n \leq 0$   
 $\therefore n \geq 2$  时  $\{x_n\}$  单调不增, 有下界为  $\sqrt{a} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在  
 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 在  $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$  两边令  $n \rightarrow \infty$   
 则有  $A = \frac{1}{2}\left(A + \frac{a}{A}\right) \Rightarrow A = \sqrt{a}$   
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$

例 17. 设  $a > 0$ ,  $x_1 > \sqrt{a}$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$ , 证明  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

$$\text{sol} : x_{n+1}^2 = a + x_n$$

$$\therefore x_{n+1}^2 - x_n^2 = x_n - x_{n-1}$$

$$\therefore x_3^2 - x_2^2 = x_2 - x_1 = \sqrt{a + \sqrt{a}} - \sqrt{a} > 0$$

$$\therefore x_3 > x_2$$

$$x_{n+1} = \frac{a}{x_{n+1}} + \frac{x_n}{x_{n+1}} \leq \frac{a}{x_1} + 1 = \sqrt{a} + 1$$

显然  $x_{n+1} > x_n$ ,  $\{x_n\}$  单调增加, 有上界为  $\sqrt{a} + 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 在  $x_{n+1}^2 = a + x_n$  两边令  $n \rightarrow \infty$

$$\text{则有 } A^2 = a + A \Rightarrow A = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + a}$$

$$\text{又 } \because A \geq \sqrt{a} > 0 \quad \therefore A = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}$$

例 18. 设  $x_1 > 0$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \sqrt{ax_n}$ , 证明  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

$$\begin{aligned} \text{sol} : x_{n+1} - x_n &= \sqrt{ax_n} - x_n \\ &= \sqrt{x_n}(\sqrt{a} - \sqrt{x_n}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{n+1} - a &= \sqrt{ax_n} - a \\ &= \sqrt{a}(\sqrt{x_n} - \sqrt{a}) \end{aligned}$$

(i) 当  $x_1 < a$  时

$$\therefore \sqrt{x_1} - \sqrt{a} < 0 \therefore x_{n+1} - x_n > 0, \text{ 且 } x_{n+1} - a < 0 \Rightarrow x_{n+1} < a$$

$$\therefore \{x_n\} \text{ 单调递增, 且上界为 } a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在}$$

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 在  $x_{n+1} = \sqrt{ax_n}$  两边令  $n \rightarrow \infty$

$$\text{则有 } A = \sqrt{aA} \Rightarrow A = a$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

(ii) 当  $x_1 > a$  时

$$\therefore \sqrt{x_1} - \sqrt{a} > 0 \therefore x_{n+1} - x_n < 0, \text{ 且 } x_{n+1} - a > 0 \Rightarrow x_{n+1} > a$$

$\therefore \{x_n\}$  单调递减, 且下界为  $a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 在  $x_{n+1} = \sqrt{ax_n}$  两边令  $n \rightarrow \infty$

则有  $A = \sqrt{aA} \Rightarrow A = a$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(iii) 当  $x_1 = a$  时,  $x_{n+1} = x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$\therefore$  综上所述, 数列  $\{x_n\}$  存在极限, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

例 19. 设  $x_1 = 2$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ , 证明  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

$$\text{sol: } x_{n+1} - x_n = 1 + \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 - \frac{x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$$

$$= \frac{x_n(1+x_{n-1}) - (1+x_n)x_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$$

$$\therefore x_2 = 1 + \frac{2}{1+2} = 1\frac{2}{3} < x_1$$

$\therefore x_{n+1} - x_n < 0$ , 即  $\{x_n\}$  单调递减

$\therefore x_{n+1} > 1 \quad \therefore$  有下界为 1  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 对  $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$  两边令  $n \rightarrow \infty$

$$\therefore A = 1 + \frac{A}{1+A} \Rightarrow A = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore A > 1 \quad \therefore A = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

例 20. 设  $0 < x_1 < 3$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ , 证明  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

$$\text{sol: } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{x_n(3-x_n)}}{x_n} = \sqrt{\frac{3}{x_n} - 1}$$

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)} \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{or } x_{n+1}^2 - \frac{9}{4} = -x_n^2 + 3x_n - \frac{9}{4} = -(x_n - \frac{3}{2})^2 \leq 0$$

$$\therefore \text{当 } n \geq 2 \text{ 时 } \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1, \text{ 且 } x_{n+1} \leq \frac{3}{2}$$

即  $\{x_n\}$  单调不减, 且有上界为  $\frac{3}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 对  $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$  两边令  $n \rightarrow \infty$

$$\therefore A = \sqrt{A(3-A)} \Rightarrow A = 0 \quad \text{or} \quad A = \frac{3}{2} \quad \because x_2 > 0 \therefore A = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$$

例 21. 设  $0 < a < 1$ ,  $x_1 = \frac{a}{2}$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \frac{a+x_n^2}{2}$ , 证明  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

例 22. 设  $a_0 \geq b_0 > 0$ , 当  $n \geq 0$  时,  $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ ,  $b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$ , 证明数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的极限均存在, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。

$$\text{sol: } a_{n+1} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2a_n}{1_n + b_n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{(a_n + b_n)^2}{4a_nb_n} \geq \frac{(2\sqrt{a_nb_n})^2}{4a_nb_n} = 1$$

$$\therefore a_n \geq b_n$$

$\therefore \{a_n\}$  为单调不增,  $\{b_n\}$  为单调不减, 且  $a_0 \geq a_n \geq b_n \geq b_0$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  存在, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$

则分别对  $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$  两边令  $n \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{A+B}{2} \\ B = \frac{2AB}{A+B} \end{cases} \Rightarrow A = B$$

$$\therefore a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n = \cdots = a_0b_0$$

$$\therefore AB = a_0b_0 \Rightarrow A = B = \sqrt{a_0b_0}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{a_0b_0}$$

例 23. 设  $x_0 > 0, y_0 > 0$ , 当  $n \geq 0$  时,  $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ , 证明数列  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  的极限均存在, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 。

$$\text{sol: } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \sqrt{\frac{y_n}{x_n}}, y_{n+1} - y_n = \frac{x_n - y_n}{2}$$



$$\begin{aligned}
&\because y_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n) \geq \sqrt{x_n y_n} = x_{n+1} \\
&\therefore \{x_n\} \text{ 单调不减, } \{y_n\} \text{ 单调不增} \\
&\because y_0 \geq y_n \geq x_n \geq x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \text{ 存在} \\
&\text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y, \text{ 则对 } x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \\
&y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \text{ 两边分别令 } n \rightarrow \infty \\
&\Rightarrow \begin{cases} X = \sqrt{XY} \\ Y = \frac{X+Y}{2} \end{cases} \Rightarrow X = Y \\
&\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n
\end{aligned}$$

例 24. 设  $x_1 = a, x_2 = b, a < b$ , 当  $n \geq 2$  时,  $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$ , 求

(1)  $y_n = x_n - x_{n-1}, n \geq 2$ ;

(2)  $\sum_{k=2}^n y_k$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

sol :

(1)

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n + x_{n+1}}{2} - x_n = -\frac{1}{2}(x_n - x_{n-1})$$

$$\therefore y_{n+1} = -\frac{1}{2}y_n$$

$$y_2 = x_2 - x_1 = b - a \Rightarrow y_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}(b - a)$$

(2)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^n y_k &= \sum_{k=2}^n (b - a) \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} \\
&= (b - a) \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} \\
&= (b - a) \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

(3)

$$x_n = y_n + y_{n-1} + \cdots + y_2 + x_1$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=2}^n y_k + x_1 \\
&= (b-a) \frac{1 - (-\frac{1}{2})^{n-1}}{\frac{3}{2}} + x_1 \\
\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b-a) \frac{1 - (-\frac{1}{2})^{n-1}}{\frac{3}{2}} + a \\
&= \frac{2}{3}(b-a) + a = \frac{1}{3}(2b-a)
\end{aligned}$$

例 25. 设  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$ , 当  $n \geq 2$  时,  $x_{n+1} = \sqrt{x_n x_{n+1}}$ , 求

(1)  $y_n = \ln x_n - \ln x_{n-1}$ ,  $n \geq 2$ ;

(2)  $\sum_{k=2}^n y_k$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

sol :

(1)

$$\begin{aligned}
\ln x_{n+1} &= \frac{1}{2}(\ln x_n + \ln x_{n-1}) \\
\ln x_{n+1} - \ln x_n &= -\frac{1}{2}(\ln x_n - \ln x_{n-1}) \\
\therefore y_{n+1} &= -\frac{1}{2}y_n \\
y_2 &= \ln 2 \\
\therefore y_n &= \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \ln 2
\end{aligned}$$

(2)

$$\sum_{k=2}^n y_k = \sum_{k=2}^n \ln 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} = \ln 2 \frac{1 - (-\frac{1}{2})^{n-1}}{\frac{3}{2}}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n \\
&= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} [y_n + y_{n-1} + \cdots + y_2 + \ln x_1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \sum_{k=2}^n y_k + \ln x_1 \right] \\
&= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \ln 2 \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{\frac{3}{2}} + \ln 1 \right] \\
&= \exp \left[ \ln 2 \cdot \frac{2}{3} + 0 \right] \\
&= \sqrt[3]{4}
\end{aligned}$$

例 26. 设  $n$  为正整数, 且  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ ,

(1) 证明  $2n \leq \int_0^x |\sin t| dt < 2(n+1)$ ;

(2) 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x}$ 。

sol :

(1)

$$\begin{aligned}
\int_0^{n\pi} |\sin t| dt &\leq \int_0^x |\sin t| dt \leq \int_0^{(n+1)\pi} |\sin t| dt \\
&\Downarrow \\
2n &\leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2(n+1)
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\frac{2n}{x} &\leq \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} \leq \frac{2(n+1)}{x} \\
&\Downarrow \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} &\leq \frac{2n}{x} \leq \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} \leq \frac{2(n+1)}{x} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} \\
&\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \frac{2}{\pi} \\
&\quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \frac{2}{\pi} \\
&\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} = \frac{2}{\pi}
\end{aligned}$$

例 27. 当  $0 < x < 1$  时, 证明  $\sin \frac{\pi x}{2} > x$ ; 又设  $0 < x_1 < 1$ , 当  $n \geq 1$  时,  $x_{n+1} = \sin \frac{\pi x_n}{2}$ , 证明数列  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。sol :

(1)

$$\text{令 } f(x) = \sin \frac{\pi x}{2} - x$$

$$f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2} - 1$$

$$\text{令 } f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{2}{\pi} \arccos \frac{2}{\pi}$$

$$0 < x < x_0 \text{ 时 } f'(x) > 0 \quad \therefore f(x) > f(0) = 0$$

$$x_0 < x < 1 \text{ 时 } f'(x) > 0 \quad \therefore f(x) > f(0) = 0$$

$$\therefore f(x) > 0 \quad (x \in (0, 1))$$

$$\therefore \text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } \sin \left[ \frac{2}{\pi} x \right] > x$$

(2)

已知  $0 < x < 1$ 设  $0 < x_n < 1$ 

$$\text{则由 (1) 可知: } 0 < x_n < x_{n+1} = \frac{\pi x_n}{2} < 1$$

$$\therefore 0 < x_{n+1} < 1$$

$$\therefore x_{n+1} > x_n \Rightarrow \{x_n\} \text{ 单调递增} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{ 存在}$$

$$\text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$$

$$\text{则 } A = \sin \frac{\pi A}{2} \quad \text{显然 } A = 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

例 28. 证明方程  $x^n + x^{n+1} + \cdots + x^2 + x = 1$ , ( $n \geq 2$ ) 在  $(0, 1)$  上存在唯一根, 并将此根记为  $x_n$ , 证明数列  $\{x_n\}$  存在极限并求出其极限。

sol :

(1)

$$\text{令 } f(x) = x^n + x^{n+1} + \cdots + x^2 + x - 1$$

$$f^{[prime]}(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 2x + 1$$

$$x \in (0, 1) \text{ 时 } f'(x) > 0 \text{ 显然成立}$$

$$\therefore f(0) = -1 < 0 \quad f(1) = n - 1 > 0$$

$$\therefore f(x) = 0 \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上存在有唯一根, 即}$$

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x = 1 \quad (n \geq 2) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上存在唯一根}$$

(2)

$$n=2 \text{ 时 } x^2 + x = 1 \Rightarrow x_2$$

$$n=3 \text{ 时 } x^3 + x^2 + x = 1 \Rightarrow x_3$$

$$n \text{ 时 } x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n = 1 \Rightarrow x_n$$

$$n+1 \text{ 时 } x_{n+1}^{n+1} + x_{n+1}^n + \cdots + x_{n+1} = 1 \Rightarrow x_{n+1}$$

若  $x_{n+1} > x_n$ , 则  $x_{n+1}^{n+1} < 0$  矛盾

$$\therefore x_{n+1} \leq x_n \text{ 且 } x_n > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n^2 + x_n = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n} = 1$$

$$\because 0 < x_n \leq x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} < 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0, \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1}{1 - x_n} = A \cdot \frac{1}{1 - A} = 1$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$$



## Chapter 2

# 导数与微分

### 2.1 考点解析

### 2.2 经典例题

例 1. 设  $f(x)$  在  $x_0$  处二阶可导, 求  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}$ 。

sol :

1°

$\because f(x)$  在  $x_0$  处二阶可导

$\therefore f(x)$  一阶导数在  $x_0$  的某个邻域内有定义

$$\begin{aligned} & \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h) - f'(x_0-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h) - f'(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0-h) - f'(x_0)}{-h} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2f''(x_0) = f''(x_0) \end{aligned}$$

2° 泰勒展开

$$\begin{aligned} f(x_0+h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2) \\ \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2)}{h^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2) - 2f(x_0)}{h^2} \\
& = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x_0)h^2 + o(h^2)}{h^2} \\
& = f''(x_0)
\end{aligned}$$

例 2. 设  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f''(0) = 2$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$ 。

sol :

1°

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''}{2} = 1$$

2°

$$\begin{aligned}
f(x + 0) &= f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = x + x^2 + o(x^2) \\
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + o(x^2) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1
\end{aligned}$$

例 3. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ , 求  $f'(0)$ ,  $f''(0)$ 。

$$\begin{aligned}
\text{sol : } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{2x} = 0 \quad \text{or} \quad = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0 \\
x \neq 0 \text{ 时 } f'(x) &= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \\
\therefore f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{3x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{3x} = -\frac{1}{3}
\end{aligned}$$

例 4. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$ , 试讨论  $f(x)$  在  $x = 0$  处的连续性、可导性。

sol :



(1) 连续性

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} \\
&= \frac{1}{2} = f(0) \\
&\therefore \text{连续}
\end{aligned}$$

(2) 可导性

$$\begin{aligned}
f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-x)(e^x - 1) - 2x}{2x^2(e^x - 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-x)e^x - 2 - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x + (2-x)e^x - 1}{6x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x + (1-x)e^x}{12x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^x}{12x} = -\frac{1}{12} \\
&\therefore \text{可导}
\end{aligned}$$

例 5.  $f(x)$  在  $x = 0$  处二阶可导,  $f(0) = 0$ ,  $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & x \neq 0 \\ f'(0) & x = 0 \end{cases}$ , 证明  $g'(x)$  在  $x = 0$  处连续。

$$\begin{aligned}
\text{sol : } g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0) - xf''(0)}{2x} = \frac{1}{2}f'' \\
x \neq 0 \text{ 时 } g'(x) &= \frac{f'(x) - f(x)}{x^2} \\
\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{f''(0)}{2} = g'(0) \\
&\therefore g'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续}
\end{aligned}$$

例 6. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ ,  $A$  为常数,  $\varphi(x) =$

$\int_0^1 f(xt)dt$ , 试讨论  $\varphi'(x)$  的连续性。

$$\text{sol} : \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A \quad \therefore f(0) = 0$$

$$\therefore \varphi(0) = \int_0^1 f(0)dt = 0$$

$$x = 0 \text{ 时, } \varphi(x) \xrightarrow{u=xt} \varphi(x) = \int_0^x f(u) \frac{du}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x f(u)du$$

$$\therefore \varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x f(u)du - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}$$

$$x \neq 0 \text{ 时, } \varphi'(x) = \frac{f(x)x - \int_0^x f(u)du}{x^2}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)x - \int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}$$

$$= A - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$$

$$\therefore \varphi(x) \text{ 连续}$$

例 7. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义, 对任意  $x, y$  有  $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$ , 且  $f(x)$  在  $x=0$  处可导,  $f'(0) = 2$ , 证明  $f(x)$  在任一点处可导, 并求  $f(x)$ 。

$$\text{sol} : \text{令 } x = y = 0 \Rightarrow f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

$$\therefore f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x f(\Delta x) + e^{\Delta x} f(x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} e^x \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

$$= e^x \cdot f'(0) + f(x) = 2e^x + f(x)$$

$$\therefore f'(x) - f(x) = 2e^x \Rightarrow f(x) = e^{-\int -1 dx} \left[ C + \int 2e^x \cdot e^{\int -1 dx} dx \right]$$

$$\therefore f(x) = e^x [C + 2x] = 2xe^x + Ce^x$$

$$\therefore f'(0) = 2 \Rightarrow C = 0$$

$$\therefore f(x) = 2xe^x$$

例 8. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续,  $f(1) = 3$ , 对任意  $x > 0, y > 0$  有  $\int_1^{xy} f(x)dt = x \int_1^y f(t)dt + y \int_1^x f(t)dt$ , 求  $f(x)$ 。

sol : 对  $y$

例 9. 设  $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 求使得  $f^{(n)}(0)$  存在的最大  $n$ 。

例 10. 设  $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$ , 求使得  $f^{(n)}(0)$  存在的最大  $n$ 。

例 11. 设  $y = (2x+3)^3(3x+2)^2$ , 求  $y^{(5)}$ ,  $y^{(6)}$ 。

例 12. 设  $y = \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - 3x}{x-1}$ , 求  $y^{(5)}$ 。

例 13. 设  $y = y(x)$  由方程  $y = \cos x + xe^y$  所确定, 求  $y'(0)$ ,  $y''(0)$ 。

例 14. 设  $y = y(x)$  由方程  $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$  所确定, 求  $f(x)$  的驻点, 并判别该驻点是否为极值点。

例 15. 通过变换  $x = \sin t$  化简方程  $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} + a^2y = 0$ , 并求原方程的通解。

例 16. 通过变换  $x = \frac{u}{\cos x}$  化简方程  $\cos x \frac{d^2y}{dx^2} - 2 \sin x \frac{dy}{dx} + 3y \cos x = e^x$ , 并求原方程的通解。

例 17. 设  $f(x) = y(x)$  满足方程  $y'' + (x + e^{2y})y'^3 = 0$ ,  $y' \neq 0$ , 试将该方程化为  $y = y(x)$  的反函数  $x = x(y)$  满足的微分方程, 并求原方程的通解。



# Chapter 3

## 导数与微分

### 3.1 考点解析

### 3.2 经典例题

例 1. (1)  $\int \frac{\ln x}{x} dx$

(2)  $\int \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} dx$

(3)  $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$

(4)  $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx$

例 2. (1)  $\int \frac{1+\ln x}{(x \ln x)^2} dx$

(2)  $\int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(1+x)} dx$

(3)  $\int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}} dx$

(4)  $\int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx$

例 3. (1)  $\int \frac{1}{x(1+x^n)} dx \quad (n \neq 0)$

(2)  $\int \frac{1}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}} dx$

(3)  $\int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

例 4. (1)  $\int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx$

(2)  $\int \frac{1}{x^2(1+x^2)^2} dx$

(3)  $\int \frac{1}{x\sqrt{4-x^2}} dx$

$$(4) \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - x + 1}} dx$$

例 5. (1)  $\int \frac{\arcsin x}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$

$$(2) \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$$

$$(3) \int \frac{1}{2 - \sqrt[3]{x+1}} dx$$

$$(4) \int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})} dx$$

例 6. (1)  $\int \frac{1}{\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-1}} dx$

$$(2) \int \frac{1}{(1+e^x)^2} dx$$

$$(3) \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

$$(4) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}} dx$$

例 7. (1)  $\int \frac{\sqrt{x}}{(x-1)^2} dx$

$$(2) \int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$$

$$(3) \int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$$

$$(4) \int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$$

例 8. (1)  $\int \frac{x}{1+\cos x} dx$

$$(2) \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx$$

$$(3) \int \frac{e^x}{x} (1 + x \ln x) dx$$

$$(4) \int e^{-|x|} dx$$

例 9. (1)  $\int \frac{1}{\sin 2x - 2 \sin x} dx$

$$(2) \int \frac{1}{\sin^2 x + 3} dx$$

$$(3) \int \frac{1}{2+\cos x} dx$$

$$(4) \int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$$

例 10. 设  $F(x)$  是  $f(x)$  的一个原函数,  $F(x) > 0$ ,  $F(0) = 1$ , 当  $x > 0$  时,  $f(x)F(x) = \frac{x e^x}{2(1+x)^2}$ , 求  $f(x)$ 。

例 11. 已知  $a \neq b$ , 求  $A, B$  的值, 使得  $\int \frac{dx}{(a+b \cos x)^2} = \frac{A \sin x}{a+b \cos x} + B \int \frac{dx}{a+b \cos x}$ 。

## **Part II**

## **线性代数**





## **Part III**

# **概率论与数理统计**



## **Part IV**

### **习题**



# Chapter 4

## 习题

### 4.1 习题1

1. 设  $f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$   $g(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & |x| \leq 1 \\ 2 & |x| > 1 \end{cases}$ , 求  $f(f(x))$ ,  $f(g(x))$ ,  $g(f(x))$ ,  $g(g(x))$ 。

2.  $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & x \geq 1 \\ 1 & -1 \leq x < 1 \\ x^2 - x + 1 & x < -1 \end{cases}$ , 求  $f(-x)$ 。

3.  $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1 \\ -1 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ , 求  $f(2x)$ ,  $f(x^2)$ ,  $f(x-2)$ 。

4. 作半径为  $R$  的球的外切正圆锥, 试建立圆锥体积  $V$  与其高  $h$  的关系, 何时体积最小。

5. 一矩形内接于半径为  $R$ , 中心角为  $2\varphi$  ( $\varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 的圆扇形中, 矩形的一对对边也平行于扇形中心角的角平分线, 试建立矩形面积  $S$  与  $\theta$  及  $S$  与边长  $x$  的关系, 何时面积最大。

6. 求下列极限

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x}$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(e^x - 1)^3}$

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]$

(4)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-x \ln x}{(x-1) \ln x}$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin 3x}{\ln \sin 2x}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ \frac{\ln x}{(1+x)^2} - \ln \frac{x}{1+x} \right]$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - \frac{2}{\pi} x \arctan x}{e^x + x}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \tan \frac{\pi x}{4} \right)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^{2x} + x e^x - 2 e^{2x} + 2 e^x}{x^3}$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( 1 - x \sin \frac{1}{x} \right)$$

7. 由条件  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 2x + 2} - ax - b) = 0$ , 解出  $a, b$ 。

8. 指出下列函数间断点的类型

$$(1) y = \frac{x^2 + x}{|x|(x^2 - 1)}$$

$$(2) y = \frac{x}{\tan x}$$

$$(3) y = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$$

$$(4) y = \arctan \frac{1}{x}$$

9. 讨论  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} x$  的连续性, 若有间断点, 指出其类型。

10. 设函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 求  $a, b$  的值。

11. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有定义, 且在  $x = 0$  处连续, 对任意  $x_1, x_2$  有  $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ 。证明  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续。

12. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2a] (a > 0)$  上连续, 且  $f(0) = f(2a)$ 。证明方程  $f(x) = f(x + a)$  在  $[0, a]$  上至少有一个根。

13. 直径相同的圆排成  $n$  行填满了等边三角形, 如图  $n = 3$  的情况。设  $A$  为等边三角形的面积,  $A_n$  为所有圆的面积, 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A}$ 。
14. 设数列  $\{x_n\}$ ,  $\{y_n\}$  满足  $x_n \leq A \leq y_n$ , 其中  $A$  为常数, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$ , 试用夹逼定理证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ 。
15. 试用夹逼定理求下列极限

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+1} \right)$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}}$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$

## 4.2 习题2

### 1. 选择题

- (1) 设  $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 且  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ , 则 ( )。
- (A)  $a < 0, b < 0$   
(B)  $a > 0, b > 0$   
(C)  $a \leq 0, b > 0$   
(D)  $a \geq 0, b < 0$
- (2) 设  $f(x)$  在  $x = a$  处可导, 则  $|f(x)|$  在  $x = a$  处不可导的充分条件是 ( )。
- (A)  $f(a) = 0$  且  $f'(a) = 0$   
(B)  $f(a) = 0$  且  $f'(a) \neq 0$   
(C)  $f(a) > 0$  且  $f'(a) > 0$   
(D)  $f(a) < 0$  且  $f'(a) < 0$
- (3) 下列条件与  $f(x)$  在  $x_0$  处可导的定义等价的是 ( )。
- (A)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$  存在  
(B)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{h}$  存在  
(C)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$  存在  
(D)  $\lim_{n \rightarrow 0} n[f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)]$  存在
- (4) 设  $f(x)$  可导,  $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ 。则  $f(0) = 0$  是  $F(x)$  在  $x = 0$  处可导的 ( )。
- (A) 充要条件  
(B) 充分条件  
(C) 必要条件  
(D) 无关条件
- (5) 设  $f(x)$  在  $(-\delta, \delta)$  内有定义, 且  $|f(x)| \leq x^2$ , 则  $x = 0$  是  $f(x)$  的 ( )。
- (A) 间断点  
(B) 连续不可导点  
(C) 可导点且  $f'(0) = 0$   
(D) 可导点且  $f'(0) \neq 0$
- (6) 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3 & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$  则  $f|_{\text{prime}}$  在  $x = 1$  处 ( )。
- (A) 左、右导数都存在  
(B) 左导数存在, 右导数不存在



- (C) 左导数不存在, 右导数存在  
(D) 左、右导数都不存在

2. 设  $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 则  $f'(x)$  在  $x = 0$  处连续
3. 设  $f(x)$  在  $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$  上连续, 对任意  $x, y$  满足  $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ , 且  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导,  $f'(0) = 2$ .  
(1) 用导数定义求  $f'(x)$   
(2) 求  $f(x)$
4.  $f(x)$  是周期为 5 的连续函数, 在  $x = 0$  的某个邻域内满足  $f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + \alpha(x)$ ,  $\alpha(x)$  是当  $x \rightarrow 0$  时比  $x$  更高阶的无穷小, 且  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(6, f(6))$  处的切线方程。
5.  $f(x)$  在  $x = 0$  处满足  $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 0$ 、 $f''(0) = 6$  求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$ 。
6.  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上满足  $f(x+1) = 2f(x)$ , 当  $0 \leq x < 1$  时  $f(x) = x(1-x^2)$ 。证明  $f(x)$  在  $x = 0$  处不可导。
7. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} & x \neq 0, x > -1 \\ -\frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$  试讨论  $f(x)$  在  $x = 0$  处的连续、可导性。
8. 设  $f(x) = \max\{\cos x, |\frac{2}{\pi}x + 1|\}$ , 指出  $f(x)$  不可导的点, 并说明理由。
9. 令  $t = \sqrt{x}$ , 将方程  $4x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2(1 - \sqrt{x}) \frac{dy}{dx} - 6y = e^{\sqrt[3]{x}}$  化为  $y$  对  $t$  的微分方程, 并求原方程的通解。
10. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)-e^{-x}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 其中  $g(x)$  在  $x = 0$  处存在二阶导数, 且  $g(0) = 1$ 、 $g'(0) = -1$ , 试讨论  $f'$  在  $x = 0$  处的连续性。
11. 设  $\rho = \rho(x)$  是抛物线  $y = \sqrt{x}$  上任一点  $M(x, y)$  ( $x \geq 1$ ) 处的曲率半径,  $s = s(x)$  是该曲线上介于点  $A(1, 1)$  与  $M$  之间的弧长, 计算  $3\rho \frac{d^2 \rho}{ds^2} - (\frac{d\rho}{ds})^2$  的值。(在直角坐标系下曲率的公式  $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$ )
12. 从点  $P_1(1, 0)$  作  $x$  轴的垂线, 交抛物线  $y = x^2$  于  $Q_1(1, 1)$ , 再从  $Q$  作抛物线的切线与  $x$  轴交于  $P_2$ , 过  $P_2$  作  $x$  轴的垂线交抛物线于  $Q_2$ , 依次重复得  $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$

- (1) 求  $\overline{OP_n}$  的长度
  - (2) 求  $\sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n}$  的和
13.  $f(x)$   $n+1$  阶可导,  $F(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 [f(x + \frac{\pi}{t}) - f(x)] \sin \frac{x}{t}$ , 试求  $F^{(n)}(x)$ 。
14. 试证曲线  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$  ( $a > 0$ ) 上任一点的切线在两坐标轴上的截距和为常数。