

**Ejercicio 9.** Sea  $\mathcal{L} = \{\wedge, \vee, \neg\}$  y  $\alpha$  una fórmula proposicional del lenguaje  $\mathcal{L}$ . Sea  $\alpha^*$  la fórmula que resulta de reemplazar en  $\alpha$ :  $\wedge \mapsto \vee$ ,  $\vee \mapsto \wedge$  y para todo  $i$ ,  $p_i \mapsto \neg p_i$ . Probar que para toda valuación  $v$ ,  $v \models \alpha^*$  si y sólo si  $v \not\models \alpha$ .

9) Inducción en complejidad

$$CB: \alpha^* = \neg \alpha$$

$$v \models \alpha \Leftrightarrow v \not\models \neg \alpha \Leftrightarrow v \not\models \alpha^*$$

P.i.:

1) Negación: Sea  $\psi \in FORM$  /  $complejidad(\psi) = k-1$   
Sea  $\Phi = \neg \psi$

$$v \models \Phi \Leftrightarrow v \models \neg \psi \Leftrightarrow v \not\models \psi \stackrel{H.i.}{\Leftrightarrow} v \models \psi^* \quad \leftarrow \text{BELLISIMO}$$

$$q.v.q: v \not\models \Phi^* \Leftrightarrow v \not\models (\neg \psi)^* \Leftrightarrow v \not\models \neg(\psi^*) \Leftrightarrow v \models \psi^* \quad \uparrow$$

Puede hacer esto porque  $*$  no modifica los  $\neg$ .

2) Implicación: Sean  $\Phi, \psi, \chi$  /  $complejidad(\Phi) = k$  y  $\Phi = \psi \rightarrow \chi$

$$v \models \Phi \Leftrightarrow v \models (\psi \rightarrow \chi) \Leftrightarrow v \not\models \psi \text{ o } v \models \chi \stackrel{H.i.}{\Leftrightarrow} v \models \psi^* \text{ o } v \not\models \chi^* \quad \Rightarrow$$

$$q.v.q: v \not\models \Phi^* \Leftrightarrow v \not\models (\psi \rightarrow \chi)^* \Leftrightarrow v \models (\psi \wedge \neg \chi)^* \Leftrightarrow v \models \psi^* \text{ o } v \not\models \chi^*$$

$\psi$	$\chi$	$\psi \rightarrow \chi$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$*$  solo modifica el  $\neg$ , todo lo demás se deja igual, así que podemos llevarlos hacia la FORM.

**Ejercicio 10.** Dada una valuación  $v$ , sean  $p$  y  $q$  dos proposiciones tales que  $v(p) = v(q)$ . Demostrar que  $v \models \varphi$  si y solo si  $v \models \varphi[p \mapsto q]$  para toda fórmula  $\varphi$ , donde  $\varphi[p \mapsto q]$  denota la fórmula que resulta de reemplazar uniformemente la proposición  $p$  por  $q$  en  $\varphi$ .

INDUCCION ESTRUCTURAL EN COMPLEJIDAD

CB:

$$1) \varphi = p \Rightarrow \varphi[p \mapsto q] = q, \text{ Sabemos que } v(p) = v(q) \Rightarrow v \models \varphi \Leftrightarrow v \models \varphi[p \mapsto q] \checkmark$$

$$2) \varphi = p', p' \neq p$$

$$\Rightarrow \varphi[p \mapsto q] = p', \text{ Como } \varphi = \varphi[p \mapsto q] \quad v \models \varphi \Leftrightarrow v \models \varphi[p \mapsto q] \checkmark$$

PI:

$$1) \Phi = \neg \psi, \text{ con } \text{complejidad}(\Phi) = k$$

$$v \models \Phi \Leftrightarrow v \models \neg \psi \Leftrightarrow v \not\models \psi$$

BELLISIMO

$$q.v.q: v \models \Phi[p \mapsto q] \Leftrightarrow v \models (\neg \psi)[p \mapsto q] \Leftrightarrow v \models \neg(\psi[p \mapsto q]) \Leftrightarrow v \not\models \psi[p \mapsto q] \stackrel{H_i}{\Leftrightarrow} v \not\models \psi$$

↑

Como  $[p \mapsto q]$  no toca  $\neg$  puedo sacar el parentesis

$$2) \Phi = \psi \rightarrow \psi, \text{ con } \text{complejidad}(\Phi) = k$$

$$v \models \Phi \Leftrightarrow v \models \psi \rightarrow \psi$$

BELLISIMO

$$q.v.q: v \models \Phi[p \mapsto q] \Leftrightarrow v \models (\psi \rightarrow \psi)[p \mapsto q] \Leftrightarrow v \models \psi[p \mapsto q] \rightarrow \psi[p \mapsto q] \stackrel{H_i}{\Leftrightarrow} v \models \psi \rightarrow \psi$$

↑

$[p \mapsto q]$  no toca  $\rightarrow$  entonces puedo sacar afuera

**Ejercicio 11.** Dado un conjunto de fórmulas  $\Gamma$ , llamamos  $\mathbf{Con}(\Gamma)$  al conjunto de consecuencias semánticas de  $\Gamma$  definido como  $\mathbf{Con}(\Gamma) = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ . Sean  $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$  conjuntos de fórmulas. Probar que:

$$1) a) \Gamma \subseteq \mathbf{Con}(\Gamma)$$

$$\text{q.v.d.: } (\forall \varphi : \text{FORM}) (\varphi \in \Gamma \Rightarrow \varphi \in \mathbf{Con}(\Gamma))$$

$$\varphi \in \Gamma \Rightarrow \text{Si } v \models \Gamma, \text{ en particular } v \models \varphi.$$

$$\text{O sea: } v \models \Gamma \Rightarrow v \models \varphi \quad \left. \begin{array}{l} \text{DEFINICION} \\ \text{Consecuencia} \\ \text{semántica} \end{array} \right\} \Gamma \models \varphi$$

$$b) \text{ si } \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \Rightarrow \mathbf{Con}(\Gamma_1) \subseteq \mathbf{Con}(\Gamma_2)$$

$$\text{Sabemos que } (\forall \varphi : \text{FORM}) (\varphi \in \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \in \Gamma_2)$$

$$\text{q.v.d.: } (\forall \Phi : \text{FORM}) (v \models \Gamma_1 \Rightarrow v \models \Phi \Rightarrow v \models \Gamma_2 \Rightarrow v \models \Phi)$$

$$\text{Supongamos } \Psi / (\forall v) (v \models \Gamma_1 \Rightarrow v \models \Psi)$$

$$\text{Queremos que para para los } v' /$$

$$v' \models \Gamma_2. \text{ Como } \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \Rightarrow v' \models \Gamma_1$$

$$\therefore v' \models \Gamma_2 \Rightarrow v' \models \Gamma_1 \Rightarrow v' \models \Psi$$

$$v' \models \Gamma_2 \Rightarrow v' \models \Psi \Rightarrow \Gamma_2 \models \Psi$$

c) Si  $\Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_2)$  y  $\Gamma_2 \subseteq \text{con}(\Gamma_3) \Rightarrow \Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_3)$

Solemos:

$$(\forall \psi : \text{FORM}) (\psi \in \Gamma_1 \Rightarrow (\forall v) (v \models \Gamma_2 \Rightarrow v \models \psi)) \mid \underline{\Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_2)}$$

$$(\forall \psi' : \text{FORM}) (\psi' \in \Gamma_2 \Rightarrow (\forall v) (v \models \Gamma_3 \Rightarrow v \models \psi')) \mid \underline{\Gamma_2 \subseteq \text{con}(\Gamma_3)}$$

q.v.q:

$$(\forall \Phi : \text{FORM}) (\Phi \in \Gamma_1 \Rightarrow (\forall v) (v \models \Gamma_3 \Rightarrow v \models \Phi)) \mid \Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_3)$$

Sea  $\Phi \in \Gamma_1$  y  $v / v \models \text{con}(\Gamma_3)$

q.v.q:  $v \models \Phi$

$$v \models \text{con}(\Gamma_3) \Leftrightarrow v \models \psi \quad \forall \psi \in \text{con}(\Gamma_3)$$

$$\text{Como } \Gamma_2 \subseteq \text{con}(\Gamma_3) \Rightarrow v \models \Gamma_2 \Rightarrow v \models \text{con}(\Gamma_2)$$

$\uparrow$   
por definici3n

Como  $\Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_2) \Rightarrow v \models \Gamma_1$ , en particular  $v \models \Phi$  porque  $\Phi \in \Gamma_1$ .

Luego como todo  $\Phi \in \Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_3)$ ,  $\Gamma_1 \subseteq \text{con}(\Gamma_3)$

Ejercicio 12. Sean  $\alpha, \beta \in \text{Form}$ .

$$12) a) \text{CON}(\{\beta\}) \subseteq \text{CON}(\{\alpha\}) \Leftrightarrow \alpha \rightarrow \beta \text{ TAUT}$$

$$\Rightarrow \mid \text{CON}(\{\beta\}) \subseteq \text{CON}(\{\alpha\})$$

$$\text{Sup } \exists v / v \models \alpha$$

$$\text{q.v.g. } v \models \beta$$

$$\beta \in \text{CON}(\{\beta\}) \text{ // a.}$$

$$\text{Si } v \models \alpha \Rightarrow v \models \text{CON}(\alpha) \Rightarrow v \models \text{CON}(\beta) \Rightarrow v \models \beta$$

$\uparrow$   
Por definición de  
 $\text{CON}()$

$$\uparrow \text{CON}(\{\beta\}) \subseteq \text{CON}(\{\alpha\})$$

Entonces siempre que  $v \models \alpha \Rightarrow v \models \beta$ . Luego  $\alpha \rightarrow \beta$  es TAUT]

$$\Leftarrow \mid \alpha \rightarrow \beta \text{ TAUT}$$

$$\text{Sea } \psi \in \text{CON}(\{\beta\})$$

$$\text{q.v.g. } \psi \in \text{CON}(\{\alpha\})$$

$$\Rightarrow \text{Tomar } v / v \models \text{CON}(\{\alpha\}), \text{ Si } v \models \psi \Rightarrow \psi \in \text{CON}(\{\alpha\})$$

$$v \models \text{CON}(\{\alpha\}) \Rightarrow v \models \alpha \xRightarrow{\alpha \rightarrow \beta \text{ TAUT}} v \models \beta \Rightarrow v \models \text{CON}(\{\beta\}) \Rightarrow v \models \psi$$

$\uparrow \alpha \in \text{CON}(\{\alpha\})$   $\uparrow$  Por def.

$$\text{Luego, } \psi \in \text{CON}(\{\alpha\}) \text{ y } \text{CON}(\{\beta\}) \subseteq \text{CON}(\{\alpha\})]$$

13) Sea  $\Gamma \subseteq \text{FORM}$

a)  $\Gamma \text{ SAT} \wedge \Gamma' \subseteq \Gamma \Rightarrow \Gamma' \text{ SAT}$

$$\exists v / v \models \Gamma \Leftrightarrow \forall \psi_i \in \Gamma, \text{PROP} : v \models \psi_i$$

$$\Gamma' = \{\psi'_1, \dots, \psi'_n\} \quad \Gamma' \subseteq \Gamma$$

$$\Rightarrow \forall \psi'_i \in \Gamma', \text{PROP} : v \models \psi'_i$$

$$\Gamma' \text{ SAT} \not\Rightarrow \Gamma \text{ SAT}$$

$$\forall \psi'_i \in \Gamma', \text{PROP} : v \models \psi'_i$$

Como  $\exists \psi_i / \psi_i \in \Gamma$  y  $\psi_i \notin \Gamma' \Rightarrow$

Puede pasar que  $v \not\models \Gamma$  pero  $v \models \Gamma'$ .

$$b) \Gamma \text{ SAT} \Leftrightarrow \text{CON}(\Gamma) \text{ SAT}$$

$$\Rightarrow \Gamma \text{ SAT}$$

$$\text{CON}(\Gamma) = \{\psi : \Gamma \models \psi\}$$

$$\exists v / v \models \Gamma$$

$$p \vee q : v \models \text{con}(\Gamma)$$

$$\text{Sea } \varphi \in \text{con}(\Gamma), \Rightarrow v \models \Gamma \Rightarrow v \models \varphi$$

$$\text{Luego } v \models \text{con}(\Gamma)$$

← / con(Γ) SAT

$$\exists v / v \models \text{con}(\Gamma) \Leftrightarrow \forall \varphi \in \text{con}(\Gamma), v \models \varphi$$

$$\text{En particular, como } \Gamma \subseteq \text{con}(\Gamma), \forall \varphi' \in \Gamma, v \models \varphi'$$

c. ¿Es cierto que para toda fórmula  $\alpha$  sucede  $\Gamma \models \alpha$  o  $\Gamma \models \neg \alpha$ ?

$$\Gamma = \{p\}, \alpha = q \Rightarrow v / v(p)=1, v(q)=0 \Rightarrow v \models \Gamma \text{ y } v \not\models \alpha \quad \Rightarrow \text{NO ES CIERTO}$$

$$\neg \alpha = \neg q \Rightarrow v' / v'(p)=1, v'(q)=1 \Rightarrow v' \models \Gamma \text{ y } v' \not\models \neg \alpha$$

14) Demuestra que son equivalentes

- $\neg(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \in \mathbf{Con}(\emptyset)$ .
- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  no son simultáneamente válidas para ninguna valuación.
- Existe una fórmula  $\beta$  tal que  $\beta \in \mathbf{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  y  $\neg \beta \in \mathbf{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$ .
- $\beta \in \mathbf{Con}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  para toda fórmula  $\beta$ .

$$a \Rightarrow b$$

Que  $\varphi \in \text{con}(\emptyset) \Rightarrow v \models \emptyset \Rightarrow v \models \varphi$ . Esto quiere decir que  $\varphi$  es TAUT.

Luego  $\neg \varphi$  es CONTRADICCION

$$\Rightarrow \neg(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \text{ es TAUT y } (\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \text{ es CONTRADICCION}$$

Luego, es fácil ver que  $\nexists v / \alpha_1, \dots, \alpha_n$  son simultáneamente válidos en  $v$ .

b  $\Rightarrow$  c

Que  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  no son simultáneamente válidos para ninguna valoración

$\forall \beta: \exists \beta / \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  y  $\neg \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$

$\text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}) = \text{FORM} \Rightarrow$  Si tomamos  $B = P$ , como  $P \in \text{FORM}$  y  $\neg P \in \text{FORM}$

$\uparrow$

$\Rightarrow B, \neg B \in \text{FORM}$

pero  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  es CONTRADICCIÓN

$\Rightarrow v \models \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \Rightarrow v \models \varphi$  es TAUT por antecedente siempre falso

c  $\Rightarrow$  d

Sobramos que  $\exists \beta / \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  y  $\neg \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$

$\forall \Gamma: \Gamma \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}) \quad \forall \Gamma: \text{FORM}$

Si  $\exists \beta / \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$  y  $\neg \beta \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$

$\Rightarrow v \models \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \Rightarrow v \models \beta$

$\Rightarrow v \models \neg \beta$

$\text{CON}(\overbrace{\text{CON}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}^{\Gamma}) = \text{CON}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

$B \in \Gamma$  y  $\neg B \in \Gamma \Rightarrow \text{CON}(\Gamma) \text{ es SAT} \Rightarrow \text{CON}(\Gamma) = \text{FORM}$

$\Rightarrow \text{CON}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \text{FORM}$



$$d \Rightarrow a$$

Supongamos que  $B \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}) \quad \forall B : \text{FORM}$

$$q \vee q : \neg(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \text{CON}(\emptyset)$$

$$\text{Supn } \neg(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \notin \text{CON}(\emptyset) \Rightarrow \exists v / v \models \emptyset \Rightarrow v \models \neg(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$\Leftrightarrow \exists v / v \models \alpha_1, \dots, \alpha_n]$$

$$\text{Sea } B : \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \Rightarrow B \in \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\})$$

$$\neg B = \neg(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \Rightarrow \neg B \notin \text{CON}(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}) \quad \text{ABS!} \quad \text{Todo } B \in \text{CON}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$\uparrow$   
 $\neg B$  SAT

$$\text{Luego } \neg(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \text{CON}(\emptyset)]$$