

Córdoba, 7 de febrero de 2022

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE FINANCIACIÓN DE MEDICACIÓN PARA LA DESHABITUACIÓN DEL TABACO: CITISINA (Todacitan® 1,5 mg 100 comprimidos)

En relación con la prescripción y financiación del medicamento CITISINA (**Todacitan®**) para el tratamiento de la deshabituación tabáquica, desde el 1 de febrero de 2023, se autoriza su financiación siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ Que el paciente esté incluido en un programa de apoyo de deshabituación tabáquica (individual y/o grupal): Se constatará la fidelización al programa si el paciente acude como mínimo a las 4 primeras sesiones. (Directriz del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir de enero 2020). Se comprobará de cara a validar la prescripción, los registros en Historia Clínica de Salud. (Hojas de consulta Intervención avanzada Tabaquismo).
- ✓ Que tenga un alto nivel de dependencia calificado por el test de Fagerström > 7.
- ✓ Que haya habido un intento de dejar de fumar en el último año.
- ✓ Que fume 10 cigarrillos o más al día.

A partir del día **1 de febrero de 2022**, previo a la dispensación de estos medicamentos, se solicitará una validación de la prescripción, de forma que se garanticen las condiciones establecidas para su financiación (esta validación la realizará el Servicio de Farmacia del Distrito a través del procedimiento de **visado de medicamentos**). Para validar dicho tratamiento, el médico prescriptor deberá cumplimentar los formularios que se han diseñado para tal fin desde el Plan Integral del Tabaquismo de Andalucía (PITA) y que se encuentran incluidos en la HSC de Diraya. De la misma manera, habrá que cerciorarse de dejar reflejo en la Historia de todas las sesiones de intervención avanzada realizadas con la persona.

Si no se constatará que dicho formulario está cumplimentado, y no existe registro de sesiones de Intervención avanzada, la prescripción se quedaría sin autorizar o validar, hasta que se cumpliesen todos los requisitos.



Cada **prescripción** se realizará por **un envase**, lo que equivale a **25 días de tratamiento** (coste tratamiento 116,93 euros).

Citisina (Todacitan® 1,5 mg, 100 comprimidos)

INDICACIÓN FINANCIADA :

Tratamiento de la dependencia al tabaco en adultos y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- ✓ Evitar en insuficiencia renal o hepática (no experiencia clínica)
- ✓ Evitar en >65 y <18 años (escasa experiencia)
- ✓ Fumar o usar productos con nicotina simultáneamente puede provocar reacciones adversas a la nicotina más graves
- ✓ Evitar con fármacos antituberculosos.
- ✓ Puede reducir eficacia de anticonceptivos.

CONTRAINDICACIONES:

- ✓ Hipersensibilidad a principio activo o excipientes
- ✓ Angina inestable
- ✓ Antecedentes de IAM reciente
- ✓ Arritmias con relevancia clínica
- ✓ Accidente reciente cerebrovascular
- ✓ Embarazo y lactancia

REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES:

- ✓ Trastornos gastrointestinales (más al inicio)
- ✓ Trastornos de la piel: erupciones cutáneas
- ✓ Cambios de apetito y aumento de peso
- ✓ Mareos, cefaleas, mialgia, astenia
- ✓ Trastornos de frecuencia cardíaca, hipertensión
- ✓ Cambios de humor, trastornos del sueño

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

- ✓ Puede tomarse con o sin alimentos



POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima	Dejar de fumar a más tardar 5º día de tratamiento
1º al 3º día	1 comp. cada 2h	6 comprimidos	Seguir fumando durante el tratamiento podría empeorar reacciones adversas.
4º al 12º día	1 comp. cada 2,5h	5 comprimidos	
Del 13º al 16º	1 comp. cada 3 h.	4 comprimidos	
Del 17º al 20º	1 comp. cada 5 h.	3 comprimidos	
Del 21º al 25º	1-2 comp. al día	2 comprimidos	En caso de fracaso de tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse en 2-3 meses

Fuentes: BIFIMED y ficha técnica