

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DE ORINA Y SUS SÍNTOMAS

1.- INGESTA DE LÍQUIDOS, AGUA:

Para prevenir la aparición de infecciones de orina la mejor medida es tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día (intentando llegar a una ingesta de líquidos que permita orinar dos litros diarios). Vaciar la vejiga cuando se presentan las primeras sensaciones miccionales, sin sobrepasar las 2-3 horas para evitar retener la orina en la vejiga, siempre que sea posible.

2.- ALIMENTOS QUE AYUDAN A PREVENIR LA APARICIÓN O LAS MOLESTIAS INICIALES:

Ante la presencia de cistitis repetidas, el consumo de arándanos rojos, frutas del bosque (zumos, yogures, etc.), cítricos (naranja, pomelos, limones, lima, mandarina), perejil, ajos, lactobacilos o yogures bifidos, espárragos, apios, pepinos, sandía y piña, puede ayudar, aunque los resultados no presentan una fuerte evidencia científica.

Una dieta equilibrada, variada, con suficiente fibra es muy recomendable y así evitamos el estreñimiento. Incluso puede ser necesario el uso de laxantes. El bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez en la orina y así acelerar su recuperación. En un vaso con 150ml de agua, añade 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclar y tomarlo. Antes de tomarlo es recomendable tomar un vaso entero de agua sola.

3.- EVITAR LA INGESTIÓN DE SUSTANCIAS IRRITANTES:

Los alimentos con gran cantidad de picante, sustancias irritantes, excesivo consumo de café, bebidas alcohólicas y té verde deben ser evitados.

Evitar el tabaquismo

4.- APLICAR BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN LA LIMPIEZA ÍNTIMA:

De atrás hacia delante, así se puede evitar que entren microorganismos que normalmente se encuentran en la vagina y el ano. La higiene íntima debe ser la correcta, utilizando jabones de pH neutro y evitando limpiezas demasiado abrasivas para la piel y mucosas. Vigilar la higiene especialmente durante la menstruación donde hay que cambiarse a menudo.

Secado de partes íntimas con secador tras la ducha.

Evitar el uso de toallas, toallitas, papel para evitar la ruptura de la mucosa vaginal.

5.- CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE INFECCIONES URINARIAS:

Cuando existen enfermedades que aumentan el riesgo de la infección de orina y sus síntomas se deben de mantener controladas o aplicar la solución requerida para cada caso (DIABETES, BAJADA DE DEFENSAS, TOMA DE CORTICOIDES, EMBARAZO, ENFERMEDADES CRÓNICAS, INMUNOSUPRESIÓN, TRASPLANTADOS, CÁLCULOS, MALFORMACIONES, INCONTINENCIA).

6.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:

Si empleas como método contraceptivo el diafragma puede ser causa de *infección de orina y sus síntomas*. También la introducción de preservativos sin lubricación y algunos espermicidas. El empleo de antibióticos de forma indiscriminada no ayuda a prevenir las infecciones, sin embargo en algunos casos, donde a pesar de todas las anteriores medidas persistan las infecciones, puede ser necesario el uso de antibiótico a bajas dosis como profilaxis.

7.- HÁBITOS DE MICCIÓN:

No inhiba el deseo de orinar, no contenga las ganas, orine frecuentemente. Después de finalizar las relaciones sexuales debes de orinar para así disminuir las posibilidades de que alguna bacteria entrara a tu uretra.

8.- USAR PRENDAS CÓMODAS:

Es conveniente que emplee ropa interior de algodón y no de nylon, las mismas deberán ser holgadas y bien ventiladas. Evitar ropa muy ajustada y calurosa en las partes vinculadas a la uretra. Los pantalones ajustados y los tejidos sintéticos absorben la humedad y por lo tanto pueden hacer que crezcan bacterias.

9.- NO MANTENER ROPAS HÚMEDAS O MOJADAS:

Si se es propenso a padecer cistitis no permanecer con el bañador mojado después del baño. Evitar ropa que mantenga la humedad en las partes íntimas.

10.- EVITAR LA IRRITACIÓN VAGINAL DURANTE EL COITO:

Una de las vías para evitar las *infecciones urinarias* y sus *síntomas* es eliminar las posibilidades de irritación de la vagina durante el coito, para ello es conveniente el uso de cremas lubricantes y en el caso de las mujeres menopáusicas emplear cremas de estrógenos. No mantener relaciones sexuales hasta que la infección urinaria esté totalmente curada o se aumenta el peligro de contagio.