

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA UROLITIASIS

1. Ingesta abundante de líquidos para mantener una diuresis de 2,5-3 l/día. Se deben reponer las pérdidas de líquidos en caso de insolación o sudor intenso. Evitar consumo de alcohol.
2. Las frutas, vegetales y fibra deben aumentarse en la dieta por su contenido en fibra, ser ricos en citratos (limón, naranja, mandarina...) y por el contenido alcalino de las verduras que elevan el pH urinario.
3. Mantener el peso corporal cerca del ideal en cuanto sea posible. Evitar sobrepeso y consumo excesivo de grasas. Realizar ejercicio físico adaptado.
4. Suprimir o restringir los alimentos ricos en oxalatos como: té, bebidas de cola, cacao, endivias, acelgas, espinacas, nabos, remolacha, nueces, guisantes...
5. Alimentación variada distribuida en comidas regulares no copiosas.
6. No restringir ingesta de calcio (recomendable 1000-1200 mg de calcio/día).
7. Limitar la sal a 4-5 g/día.
8. Consumir proteínas vegetales en forma de verduras y legumbres alrededor de 40 g/d.
9. Limitar las proteínas animales (carnes, pescados, aves) a 0.8-1.0 g/kg/día y alimentos ricos en purinas:
 - a. Carnes rojas (ternera, cerdo, cordero, carne de caza ...)
 - b. Pescado azul, mariscos y crustáceos
 - c. Embutidos, caldos-salsas de carne
 - d. Vísceras, higadillos, riñones ...
 - e. Verduras del tipo coliflor, espinacas, espárragos y champiñones-setas.