

Cefalea tensional

- Amitriptilina 25 0-0-1/2 7 días
0-0-1 7 días
0-0-1^{1/2} 7 días
0-0-2 6 meses-12 meses
- Nortriptilina 25, pauta similar
- Mirtazapina 30 0-0-1/2 7 días
2ª opción 0-0-1 6-12 meses
- Citalopram 30 ½-0-0 7 días
1-0-0 6-12 meses

Vale cualquier ISRS, solo o combinado con tricíclicos.

•DOSIS HABITUAL: 25-60 mg.
•A veces hay que llegar a 75-100 mg.
•Contraindicados en glaucoma.
•Precaución en personas mayores por el efecto anticolinérgico (deterioro cognitivo, prostatismo).
•Nortriptilina tiene menos efectos anticolinérgicos y se tolera mejor.

Migraña

- Flunarizina 5 0-0-1 6 meses
(0-0-2)
- Propranolol 40 1/2-0-1/2 5 días
1-0-1 5 días-6 meses
1-1-1 6 meses
- Valproico 500 retard 0-0-1 7 días
1-0-1 6 meses
- Topiramato 50 0-0-1/2 7 días
1/2-0-1/2 7 días
1/2-0-1 7 días
1-0-1 6 meses-12 meses

•La dosis es 80-160 mg/día, si se tolera (estreñimiento, pesadillas, insomnio, mareos...).

•Sumial[®] retard 160 1-0-0