Economía I

Preferencias

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Plan de estas slides

Seguimos con el lado del consumidor.

1. Introducir un concepto fundamental: las preferencias y sus axiomas.
2. Entender qué es la Tasa Marginal de Sustitución y cómo se relaciona con las curvas de indiferencia.
3. Ver ejemplos concretos de preferencias: Complementos Perfectos y Sustitutos Perfectos.

Repaso

- Recordar que los consumidores eligen la **mejor opción**, dentro de las **alternativas factibles**.
- Las combinaciones posibles de bienes las llamamos **canastas de consumo**.
- Siguiendo el ejemplo de la clase pasada, $C = (q_p, q_c)$ es una canasta de consumo posible si cumple $p_c q_c + p_p q_p \leq M$

Repaso

- Con dos bienes, gráficamente, una canasta de consumo es un punto en el plano (un par ordenado).
- La canasta del gráfico es $C = (a, b)$.
- La misma estrategia se puede extender a canastas de mayor dimensión, aunque ya no vamos a poder representarlas gráficamente de esta manera. Vamos a trabajar con 2 bienes para ganar la intuición.



Piensen qué cosas cambiarían si tuviésemos más bienes.

Las preferencias del estudiante



Las preferencias del estudiante

- Hasta ahora vimos que nuestros ingresos imponen una restricción que puede influir en nuestra elección de consumo.
  - Cuando tenemos que decidir qué canasta queremos consumir, debemos limitarnos a elegir entre todas las canastas **alcanzables**.
- ¿Qué nos falta para resolver el problema del consumidor?
  - Necesitamos identificar qué **prefiere** entre todas las canastas que se pueden alcanzar.

Tenemos distintas combinaciones...

Supongamos que tenemos un conjunto de canastas de pizza y cerveza.

Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

...que podemos representar así



Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

...que podemos representar así



Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

...que podemos representar así



Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

...que podemos representar así



Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

...que podemos representar así



Canasta	Pizza	Cerveza
A	3	15
B	5	11
C	10	7
D	15	5
E	20	3
F	15	11
G	20	9
H	15	15

Algunas nos dejan igual de feliz

Supongamos que el estudiante revela que se encuentra indiferente entre las canastas A, B, C, D y E



Algunas nos dejan igual de feliz

Supongamos que el estudiante revela que se encuentra indiferente entre las canastas A, B, C, D y E



Algunas nos dejan igual de feliz

Supongamos que el estudiante revela que se encuentra indiferente entre las canastas A, B, C, D y E



Algunas nos dejan igual de feliz

Supongamos que el estudiante revela que se encuentra indiferente entre las canastas A, B, C, D y E



Las curvas de indiferencia

- Todas las posibles canastas que otorgan el mismo nivel de utilidad o felicidad se encuentran sobre una misma **curva de indiferencia**.
- ¿Qué nivel de felicidad nos dan esas canastas?
  - No nos interesa cuánto. Lo único relevante es si una canasta tiene una utilidad mayor a otra.
  - Vemos que las canastas F y G están sobre otra curva de indiferencia. Osea que nos dan otro nivel de utilidad. Lo mismo sucede con la canasta H.

Las curvas de indiferencia

- Todas las posibles canastas que otorgan el mismo nivel de utilidad o felicidad se encuentran sobre una misma **curva de indiferencia**.
- ¿Qué nivel de felicidad nos dan esas canastas?
  - No nos interesa cuánto. Lo único relevante es si una canasta tiene una utilidad mayor a otra.
  - Vemos que las canastas F y G están sobre otra curva de indiferencia. Osea que nos dan otro nivel de utilidad. Lo mismo sucede con la canasta H.
- La cantidad de curvas de indiferencia podemos suponer que es **infinita**. Esto nos forma un **mapa de indiferencia**, donde las que están más a la derecha y arriba brindan más utilidad.

Preferencias

Las **preferencias** (o sistema de preferencias) son la forma en la que un individuo **compara** diversas canastas.
Se la suele denotar por $\succsim$.
Supongamos dos canastas: $X = (a, b)$ e $Y = (a', b')$.

- Si el individuo encuentra X al menos tan buena como Y, escribimos $X \succsim Y$ y decimos que X **es <u>preferido</u> a** Y.
- Si ambas canastas le dan lo mismo, escribimos $X \sim Y$ y decimos que **el consumidor <u>está indiferente</u> entre** X **e** Y .
- Si encuentra X estrictamente mejor a Y, escribimos $X \succ Y$ y decimos que X **es <u>estrictamente preferido</u> a** Y.

Teoría de elección del consumidor: Axiomas

Vamos a suponer que las preferencias de los consumidores cumplen con los siguientes **axiomas**:

- **Completitud**: Siempre es posible comparar dos canastas de consumo cualesquiera.
- **Transitividad**: Si una canasta de consumo A es preferida a una canasta B, y la canasta B es preferida a una canasta C, entonces la canasta A es preferida a la canasta C.
  - $A \succsim B$ y $B \succsim C$ entonces $A \succsim C$ (vale también para preferencia estricta $\succ$ e indiferencia $\sim$)

Cuando las preferencias cumplen con estos dos axiomas, decimos que son preferencias **racionales**. Es decir, el consumidor puede ordenar las canastas de acuerdo a sus gustos.

Utilidad

La pregunta clave radica en: ¿Cómo se comparan las canastas? →¿Qué **criterio** sigue el consumidor para afirmar que A $\succsim$ B?
Buscamos un método para comparar canastas.

- En economía se trabaja con una herramienta que simplifica este análisis: la **función de utilidad** $\rightarrow U(x) = u$
- La idea es simple: A cada canasta se le asigna un **número** que **mide** la **utilidad** que recibe el individuo por consumir esa canasta. Si el número asignado a la canasta A es mayor al de B, luego A es preferida a B.
  - Sea f la función de utilidad tal que $f(3, 15) = 7$ y $f(5, 11) = 2$.
  - Luego $A \succ B$.
- Pueden pensar que esta función nos dice "cuán feliz" está el agente con cada canasta: si el número asociado a una canasta es más alto, entonces un agente es "más feliz", por lo que prefiere esa canasta a otra con número más bajo.

Utilidad

Luego, dadas las canastas x e y podemos tener:

- $u(x) > u(y)$: entonces x es estrictamente preferida a y ($x \succ y$)
- $u(x) \geq u(y)$: entonces x es preferida a y ($x \succsim y$)
- $u(x) = u(y)$: entonces x es indiferente a y ($x \sim y$)

Curvas de indiferencia: Ejemplo



Curvas de indiferencia

- El consumidor está indiferente entre las canastas A, B y C. Por eso están sobre una **misma** curva de indiferencia.
- Supongamos primero que el consumidor quiere consumir de ambos bienes, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de cervezas y de pizzas que consuma, tendrá mayor utilidad.
- Notamos que si se reduce el consumo de cervezas del punto B al C, entonces, el consumo de pizzas tiene que aumentar para que el consumidor tenga el mismo nivel de satisfacción, y así mantenerse en la misma curva.
- Es por eso que **en general** (no siempre) tienen pendiente negativa.
- Si la pendiente de la curva de indiferencia es negativa, el individuo enfrenta la siguiente disyuntiva si quiere mantener el mismo nivel de utilidad: puede consumir más de un bien, pero tiene que dejar de consumir del otro bien.

Mapa de indiferencia

- Vamos a **suponer** que todas las canastas se pueden comparar entre sí. Es decir vamos a trabajar con preferencias tales que, dadas 2 canastas cualesquiera x e y, el agente **siempre** puede determinar si $x \succ y$, $x \succsim y$ o $x \sim y$, o lo que es equivalente, la función de utilidad le asigna un nivel de utilidad u a *cada* canasta de consumo.
- Pero, ¿cuáles son mejores y cuáles son peores? Cuando se grafican las curvas de indiferencia, se ponen pequeñas flechas que indican la **dirección de las canastas preferidas**.
- En el ejemplo, el consumidor prefiere canastas que se ubiquen sobre curvas de indiferencia que están más arriba y a la derecha **porque prefiere consumir más pizzas y más cervezas**.

Mapa de indiferencia



Implicancia del axioma de transitividad

- Cada curva de indiferencia en particular está asociada a un nivel de satisfacción distinto para el consumidor.
- El axioma de transitividad implica que las curvas de indiferencia **no pueden cortarse.**
- Si éstas se cortaran, habría canastas entre las cuales el individuo estaría indiferente y pertenecerían a distintas curvas de indiferencia.

Implicancia del axioma de transitividad



El consumidor está indiferente entre A y C y entre A y B, por lo tanto, por transitividad, debería estar indiferente entre B y C

Entonces B y C deben pertenecer a la misma curva de indiferencia

Pero la canasta B no pertenece a la misma curva de indiferencia que la canasta C

Implicancia del axioma de transitividad

En el gráfico anterior se da lo siguiente:

- Dado que A y B se hallan en la misma curva de indiferencia, el consumidor está indiferente entre ambas canastas ($A \sim B$).
- Dado que A y C se hallan en la misma curva de indiferencia, el consumidor está indiferente entre ambas canastas ($A \sim C$).
- Pero si está indiferente entre A y B, y entre A y C, también lo está entre C y B ($C \sim B$).
- Entonces, C y B deberían estar en la misma curva de indiferencia si las preferencias fueran **transitivas**.
- Por lo tanto, estas preferencias no satisfacen el axioma de transitividad.

Lo mismo pasa con el resto de puntos que componen las dos curvas que se cortan.