

Problema 1 (segundo parcial)

domingo, 11 de mayo de 2025 21:32

Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, obtén la solución general del sistema completo:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2x - y - z + e^{-t} \\ y' &= x - z \\ z' &= x - y + 2e^{-t} \end{aligned} \right\}$$

$$Y' = A \cdot Y + B \Rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}$$

a) SGSH:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} (2-\lambda) & -1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = 1 \text{ (doble)} \end{cases}$$

• Autovectores asociados a $\lambda = 0$: $S_{\lambda=0}$

$$(A - 0I)X = 0 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha \\ y = \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \Rightarrow B_{S_{\lambda=0}} = \{ (1, 1, 1) \}$$

• Autovectores asociados a $\lambda = 1$: $S_{\lambda=1}$

$$(A - 1I)X = 0 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = \alpha \\ z = \beta \end{cases} \Rightarrow B_{S_{\lambda=1}} = \{ (1, 1, 0), (1, 0, 1) \}$$

$$Y_{SGSH} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{0 \cdot t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t$$

b) SGSC / SPSC: método de coeficientes indeterminados.

$$s_2(t) = e^{-t} \rightarrow \left. \begin{aligned} &\alpha = -1 \\ &\rho = 0 \\ &P_m(t) = 0 \rightarrow m = 0 \\ &Q_n(t) = 1 \rightarrow n = 0 \end{aligned} \right\} \kappa = 0 \Rightarrow Y_p(t) = A \cdot e^{-t}$$

Problema: $y_p = \begin{pmatrix} a_1 e^{-t} \\ a_2 e^{-t} \\ a_3 e^{-t} \end{pmatrix} \rightarrow y'_p = \begin{pmatrix} -a_1 e^{-t} \\ -a_2 e^{-t} \\ -a_3 e^{-t} \end{pmatrix}$

$$y' = A \cdot y + B \Rightarrow \begin{pmatrix} -a_1 e^{-t} \\ -a_2 e^{-t} \\ -a_3 e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 e^{-t} \\ a_2 e^{-t} \\ a_3 e^{-t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a_1 e^{-t} = (2a_1 - a_2 - a_3) e^{-t} + e^{-t} \\ -a_2 e^{-t} = (a_1 - a_3) e^{-t} + 0 \\ -a_3 e^{-t} = (a_1 - a_2) e^{-t} + 2e^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a_1 = 2a_1 - a_2 - a_3 + 1 \\ -a_2 = a_1 - a_3 \\ -a_3 = a_1 - a_2 + 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a_1 - a_2 - a_3 = -1 \\ a_1 + a_2 - a_3 = 0 \\ a_1 - a_2 + a_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 = -1 \\ a_2 = -1/2 \\ a_3 = -3/2 \end{pmatrix} \Rightarrow y_p = \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ -1/2 e^{-t} \\ -3/2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

Solución:

$$y_{SGSH} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{0 \cdot t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ -1/2 e^{-t} \\ -3/2 e^{-t} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = C_1 + C_2 e^t + C_3 e^t - e^{-t} \\ y(t) = C_1 + C_2 e^t - \frac{1}{2} e^{-t} \\ z(t) = C_1 + C_3 e^t - \frac{3}{2} e^{-t} \end{cases}$$

Problema 2 (segundo parcial)

domingo, 11 de mayo de 2025 21:32

Determina los puntos críticos del siguiente sistema y analiza su tipo para todos ellos utilizando el método de linealización, indicando junto con el tipo si son estables, asintóticamente estables o inestables.

$$\begin{cases} x' = (x-1)^2 + y^2 - 10 \\ y' = (x+1)^2 + y^2 - 10 \end{cases}$$

- Vamos a identificar los puntos críticos:

$$\begin{aligned} x'=0 &\Rightarrow (x-1)^2 + y^2 - 10 = 0 \Rightarrow y^2 = 10 - (x-1)^2 \\ y'=0 &\Rightarrow (x+1)^2 + y^2 - 10 = 0 \Rightarrow y^2 = 10 - (x+1)^2 \end{aligned} \Rightarrow \cancel{10 - (x-1)^2} = \cancel{10 - (x+1)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{x^2 - 2x + 1} = \cancel{x^2 + 2x + 1} \Rightarrow x=0 \Rightarrow y^2 = 10 - 1 = 9 \Rightarrow y = \pm 3$$

Luego los puntos críticos son $(0, 3)$ y $(0, -3)$.

- Calculamos ahora la matriz Jacobiana:

$$g_1(x, y) = (x-1)^2 + y^2 - 10$$

$$g_2(x, y) = (x+1)^2 + y^2 - 10$$

$$J_g(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x-1) & 2y \\ 2(x+1) & 2y \end{pmatrix}$$

$$\boxed{(0, 3)} \quad J_g(0, 3) = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = A$$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} (-2-\lambda) & 6 \\ 2 & (6-\lambda) \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 24 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2 + 2\sqrt{7} > 0 \\ \lambda = 2 - 2\sqrt{7} < 0 \end{cases}$$


Luego se trata de un punto silla.

Se trata de un punto silla (inestable).

$$\boxed{(0, -3)} \quad J_g(0, -3) = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} = B$$

$$|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} (-2-\lambda) & -6 \\ 2 & (-6-\lambda) \end{vmatrix} = \lambda^2 + 8\lambda + 24 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -4 + i2\sqrt{2} \\ \lambda = -4 - i2\sqrt{2} \end{cases}$$

Se trata de una espiral estable (asintóticamente estable).



Problema 3 segundo parcial)

domingo, 11 de mayo de 2025 21:32

Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' - 6y' + 5y = 3e^{2x} \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$ utilizando transformadas de Laplace.

$$y'' - 6y' + 5y = 3e^{2x} \Rightarrow \mathcal{L}\{y'' - 6y' + 5y\} = \mathcal{L}\{3e^{2x}\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} - 6\mathcal{L}\{y'\} + 5\mathcal{L}\{y\} = 3 \cdot \mathcal{L}\{e^{2x}\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)) - 6(s Y(s) - y(0)) + 5 Y(s) = 3 \cdot \frac{1}{s-2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (s^2 Y(s) - 2s - 3) - 6(s Y(s) - 2) + 5 Y(s) = \frac{3}{s-2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (s^2 - 6s + 5) Y(s) = \frac{3}{s-2} + 2s + 3 - 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (s^2 - 6s + 5) Y(s) = \frac{3 + (2s - 9)(s-2)}{s-2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{2s^2 - 13s + 21}{(s-2)(s^2 - 6s + 5)} = \frac{2s^2 - 13s + 21}{(s-1)(s-2)(s-5)}$$

$$\frac{2s^2 - 13s + 21}{(s-1)(s-2)(s-5)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s-5} = \frac{5/2}{s-1} + \frac{(-1)}{s-2} + \frac{(1/4)}{s-5}$$

$$Y(s) = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s-2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-5} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y(x) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{2} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s-2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-5}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{5}{2} e^x - e^{2x} + \frac{1}{2} e^{5x}}$$

Problema 4 (segundo parcial)

domingo, 11 de mayo de 2025 21:32

Calcula los primeros cuatro términos de las dos soluciones linealmente independientes de la ecuación $(3+x)y'' + (1+x)y' + (1-4x)y = 0$ utilizando series de potencias.

$$(3+x)y'' + (1+x)y' + (1-4x)y = 0 \Rightarrow y'' + \frac{(1+x)}{3+x}y' + \frac{(1-4x)}{3+x}y = 0$$

$b_1(x)$ $b_0(x)$

$x=0$ es un punto ordinario de la ecuación, ya que $b_1(x)$ y $b_0(x)$ son analíticas en $x=0$.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^{n-1} \rightarrow y'' = \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2}$$

$$(3+x)y'' + (1+x)y' + (1-4x)y = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (3+x) \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2} + (1+x) \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^{n-1} + (1-4x) \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot x^n = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3 \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^{n-1} +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot x^{n+1} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3 \cdot c_2 \cdot 2 \cdot (2-1) \cdot x^0 + 3 \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-1} +$$

$$+ c_1 \cdot 1 \cdot x^0 + \sum_{n=2}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n \cdot x^n + c_0 \cdot x^0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot x^{n+1} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6c_2 + 3 \sum_{k=1}^{\infty} c_{k+2} \cdot (k+2) \cdot (k+1) \cdot x^k + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k+1} \cdot (k+1) \cdot k \cdot x^k + c_1 +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} c_{k+1} \cdot (k+1) \cdot x^k + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot k \cdot x^k + c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot x^k - 4 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} \cdot x^k = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (c_0 + c_1 + 6c_2) +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \left(3(k+1)(k+2)c_{k+2} + (k(k+1) + k+1)c_{k+1} + (k+1)(k - 4c_{k-1}) \right) x^k = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_0 + c_1 + 6c_2 = 0 \\ 3(k+1)(k+2)c_{k+2} + (k+1)^2 c_{k+1} + (k+1)c_k - 4c_{k-1} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_2 = -\frac{(c_0 + c_1)}{6} \\ c_{k+2} = \frac{-(k+1)^2 c_{k+1} - (k+1)c_k + 4c_{k-1}}{3(k+1)(k+2)} \quad (k \geq 1) \end{cases}$$

$$k=1 \rightarrow c_3 = \frac{-4c_2 - 2c_1 + 4c_0}{3 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{2}{9} \left(\frac{c_0 + c_1}{6} \right) - \frac{1}{9} c_1 + \frac{2}{9} c_0 = \frac{7}{27} c_0 - \frac{2}{27} c_1$$

Solución:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots =$$

$$= c_0 + c_1 x + \left(-\frac{1}{6} c_0 - \frac{1}{6} c_1 \right) x^2 + \left(\frac{7}{27} c_0 - \frac{2}{27} c_1 \right) x^3 + \dots \Rightarrow$$

$$y(x) = c_0 \left(1 + 0 \cdot x - \frac{1}{6} x^2 + \frac{7}{27} x^3 + \dots \right) + c_1 \left(0 + x - \frac{1}{6} x^2 - \frac{2}{27} x^3 + \dots \right)$$