

Problema 1

lunes, 31 de marzo de 2025 0:30

Demuestra que dos soluciones de una ecuación diferencial ordinaria son linealmente independientes si y solo si su Wronskiano es distinto de cero.

$$y_1(x), y_2(x) \text{ linealmente independientes} \Leftrightarrow W(y_1, y_2) \neq 0$$

$$y_1(x), y_2(x) \text{ linealmente dependientes} \Leftrightarrow W(y_1, y_2) = 0$$

\Rightarrow Caso 1:

$$y_1(x) = 0 \Rightarrow W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ 0 & y_2' \end{vmatrix} = 0$$

Caso 2:

$$\left. \begin{array}{l} y_1(x) \neq 0 \\ y_2(x) = \lambda \cdot y_1(x) \end{array} \right\} \Rightarrow W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & \lambda y_1 \\ y_1' & \lambda y_1' \end{vmatrix} = \lambda y_1 y_1' - \lambda y_1 y_1' = 0$$

\Leftarrow Caso 1:

$$y_1(x) = 0 \text{ (alt. } y_2(x) = 0) \Rightarrow y_1(x), y_2(x) \text{ son linealmente dependientes}$$

Caso 2:

Ni $y_1(x)$ ni $y_2(x)$ son la función nula

$$W(y_1, y_2) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y_1 \cdot y_2' - y_1' \cdot y_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{y_1'}{y_1} = \frac{y_2'}{y_2} \Rightarrow \int \frac{y_1'}{y_1} dx = \int \frac{y_2'}{y_2} dx \Rightarrow \ln|y_1| = \ln|y_2| + C_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |y_1| = C_2 \cdot |y_2| \Rightarrow y_1 = C_3 \cdot y_2 \Rightarrow y_1(x), y_2(x) \text{ linealmente dependientes}$$

Problema 2

lunes, 31 de marzo de 2025 0:30

Resuelve la ecuación diferencial $(3x^2y^2 - 2y^4)dx + (x^3y - 2xy^3)dy = 0$ utilizando el factor integrante adecuado.

Comprobamos primero que no es diferencial exacta:

$$\underbrace{(3x^2y^2 - 2y^4)}_{M(x,y)} dx + \underbrace{(x^3y - 2xy^3)}_{N(x,y)} dy = 0$$

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = 6x^2y - 2y^3 \neq 3x^2 - 2y^3 = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$$

Comprobamos a continuación que tiene un factor integrante $\mu = \mu(x)$:

$$\underbrace{\mu(x) \cdot (3x^2y^2 - 2y^4)}_{P(x,y)} dx + \underbrace{\mu(x) \cdot (x^3y - 2xy^3)}_{Q(x,y)} dy = 0$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} \Rightarrow \mu \cdot (6x^2y - 2y^3) = \mu' \cdot (x^3y - 2xy^3) + \mu(3x^2y - 2y^3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu(6x^2y - 2y^3 - 3x^2y + 2y^3) = \mu'(x^3y - 2xy^3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu(3x^2y - 2y^3) = \frac{d\mu}{dx}(x^3y - 2xy^3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d\mu}{\mu} = \frac{3x^2y - 2y^3}{x^3y - 2xy^3} dx \Rightarrow \frac{d\mu}{\mu} = \frac{\cancel{3y}(x^2 - 2y^2)}{\cancel{xy}(x^2 - 2y^2)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{\mu} d\mu = \int \frac{3}{x} dx \Rightarrow \ln|\mu| = 3\ln|x| + C \Rightarrow \mu = x^3$$

Volvemos a la ecuación diferencial exacta:

$$x^3 \cdot (3x^2y^2 - 2y^4) dx + x^3 \cdot (x^3y - 2xy^3) dy = 0 \Rightarrow$$

$$\underbrace{(3x^5y^2 - 2x^3y^4)}_{P(x,y)} dx + \underbrace{(x^6y - 2x^4y^3)}_{Q(x,y)} dy = 0$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 6x^5y - 8x^3y^3 = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} \Rightarrow \text{Diferencial exacta}$$

$$\bullet \frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = P(x,y) \Rightarrow F(x,y) = \int (3x^5y^2 - 2x^3y^4) dx = \frac{x^6y^2}{2} - \frac{x^4y^4}{2} + C(y)$$

$$\bullet \frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = Q(x,y) \Rightarrow \cancel{x^6y} - 2\cancel{x^4y^3} + C'(y) = \cancel{x^6y} - 2\cancel{x^4y^3} \Rightarrow C'(y) = 0 \Rightarrow C(y) = C$$

$$\text{Solución: } F(x,y) = \boxed{\frac{x^6y^2}{2} - \frac{x^4y^4}{2} + C = 0}$$

Nota: La solución también se puede expresar como $x^4y^2(x^2 - y^2) = K$.

Problema 3

lunes, 31 de marzo de 2025 0:30

Resuelve la ecuación no homogénea $y'' + y' - 6y = -5e^{2x} + \sin(x)$.

a) SGEH:

$$r^2 + r - 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r=2 \\ r=-3 \end{cases} \Rightarrow y_{SGEH} = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 e^{-3x}$$

b) SGEC / SPEC:

Vamos a resolver el problema utilizando el método de coeficientes indeterminados.

$$S(x) = S_1(x) + S_2(x), \quad S_1(x) = -5e^{2x}, \quad S_2(x) = \sin(x)$$

$$S_1(x) = -5e^{2x} \Rightarrow \begin{cases} \alpha=2 \\ \beta=0 \end{cases} t=1 \quad \left[\begin{array}{l} P_m(x) = 0 \rightarrow m=0 \\ Q_n(x) = 1 \rightarrow n=0 \end{array} \right] \quad K = \max(m, n) = 0$$

por lo tanto, $y_{p1} = A \cdot x e^{2x}$

$$S_2(x) = \sin(x) \Rightarrow \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=1 \end{cases} t=0 \quad \left[\begin{array}{l} P_m(x) = 1 \rightarrow m=0 \\ Q_n(x) = 0 \rightarrow n=0 \end{array} \right] \quad K = \max(m, n) = 0$$

luego $y_{p2} = B \cdot \sin(x) + C \cdot \cos(x)$

Si probamos a la vez ambas soluciones, tendremos lo siguiente:

$$y_p = A \cdot x e^{2x} + B \cdot \sin(x) + C \cdot \cos(x) \rightarrow y'_p = (A + 2Ax) e^{2x} + B \cos(x) - C \sin(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow y''_p = (4A + 4Ax) e^{2x} - B \sin(x) - C \cos(x)$$

$$y'' + y' - 6y = -5e^{2x} + 5\sin(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left((4A + 4Ax)e^{2x} - B\sin(x) - C\cos(x) \right) + \left((A + 2Ax)e^{2x} + B\cos(x) - C\sin(x) \right) - 6(Ax e^{2x} + B\sin(x) + C\cos(x)) = -5e^{2x} + 5\sin(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (4A + 4\cancel{Ax} + A + 2\cancel{Ax} - 6\cancel{Ax})e^{2x} + (-B - C - 6B)\sin(x) + (-C + B - 6C)\cos(x) = -5e^{2x} + 5\sin(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5A = -5 \\ -7B - C = 1 \\ B - 7C = 0 \end{cases} \Rightarrow A = -1, B = -\frac{7}{50}, C = -\frac{1}{50}$$

Por lo tanto, la solución es:

$$y_{\text{sol}} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x} - x e^{2x} - \frac{7}{50} \sin(x) - \frac{1}{50} \cos(x)$$

Problema 4

lunes, 31 de marzo de 2025 0:30

Obtén la expresión de las curvas ortogonales a la familia dada por la ecuación $x^2 + b^2 y^2 = 1$.

1) Despejamos b^2 :

$$x^2 + b^2 y^2 = 1 \Rightarrow \cancel{2x} + b^2 \cdot \cancel{2y} \cdot y' = 0 \Rightarrow b^2 = \frac{-x}{y \cdot y'}$$

2) Obtenemos la ecuación diferencial asociada a la familia inicial:

$$x^2 + b^2 y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + \left(\frac{-x}{\cancel{y} \cdot y'} \right) y^{\cancel{x}} = 1 \Rightarrow x^2 \cdot y' - xy = y' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x^2 - 1) y' = xy \Rightarrow y' = \frac{xy}{x^2 - 1}$$

3) Planteamos la ecuación diferencial de la nueva familia:

$$y' = \frac{-(x^2 - 1)}{xy} = \frac{1 - x^2}{xy} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 - x^2}{xy} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int y \cdot dy = \int \frac{(1 - x^2)}{x} dx \Rightarrow \boxed{\frac{y^2}{2} = \ln|x| - \frac{x^2}{2} + C_1} \Rightarrow$$

Alternativamente, la solución se puede escribir como

$$\boxed{x^2 + y^2 = \ln(x^2) + C_2}$$