Matriz de evaluaciones de un escenario

Cada fila reúne dos entrenamientos con la misma semilla de aprendizaje.

	Formulación local (A) $q=1$	$q=2$	$q=3$	$q=4$	$q=5$	Formulación vecinal (C) $q=1$	$q=2$	$q=3$	$q=4$	$q=5$	Medias por política	Diferencia
$s=1$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=2$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=3$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=\vdots$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=24$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$

Cada celda contiene $w_{s,b,q}$; q identifica la misma semilla de tráfico para A y C.

Incertidumbre del contraste entre pares

24 filas completas por red Unidad de remuestreo: el par s	20.000 remuestreos con reemplazo	Intervalos percentiles 95 % y 98,33 %