Matriz de evaluaciones de un escenario

Cada fila reúne dos entrenamientos con la misma semilla de aprendizaje.

	Formulación local (A)					Formulación vecinal (C)					Medias por política	Diferencia
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
$s = 1$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s = 2$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s = 3$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s = 24$	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$

Cada celda contiene $w_{s,b,q}$; q identifica la misma semilla de tráfico para A y C.

Incertidumbre del contraste entre pares

24 filas completas por red Unidad de remuestreo: el par s	20.000 remuestreos con reemplazo	Intervalos percentiles 95 % y 98,33 %