

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 24 de mayo de 2026, 19:33
Completado	domingo, 24 de mayo de 2026, 19:37
Duración	3 minutos 49 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. El producto de la masa por la aceleración
- ☐ b. La velocidad lineal entre el radio
- ☒ c. El cambio de velocidad angular por unidad de tiempo ✓
- ☐ d. La distancia recorrida en la circunferencia

La respuesta correcta es: El cambio de velocidad angular por unidad de tiempo



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones representa un MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. Un ventilador que disminuye su velocidad angular hasta detenerse ✓
- ☐ b. Una piedra cayendo libremente
- ☐ c. Un satélite en órbita circular con velocidad constante
- ☐ d. Una bicicleta avanzando en línea recta

La respuesta correcta es: Un ventilador que disminuye su velocidad angular hasta detenerse

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)?

Seleccione una:

- ☐ a. No hay aceleración
- ☐ b. La trayectoria no es circular
- ☐ c. La aceleración angular es variable
- ☒ d. La velocidad angular cambia uniformemente con el tiempo ✓



La respuesta correcta es: La velocidad angular cambia uniformemente con el tiempo

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión para la velocidad angular final en el MCUV?

Seleccione una:

- ☐ a. $\omega = \omega_0 \cdot t^2$
- ☐ b. $\omega = 2\pi\alpha \cdot t$
- ☐ c. $\omega = \alpha \cdot \omega_0$
- ☒ d. $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$ ✓

La respuesta correcta es: $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el desplazamiento angular en MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. $\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$ ✓
- ☐ b. $\theta = \alpha \cdot t$
- ☐ c. $\theta = \omega_0^2 + \alpha$
- ☐ d. $\theta = \omega \cdot t^2$

La respuesta correcta es: $\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha$



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si la aceleración angular es negativa?

Seleccione una:

- ☒ a. La velocidad angular disminuye con el tiempo ✓
- ☐ b. No cambia la velocidad
- ☐ c. La velocidad angular aumenta
- ☐ d. El cuerpo se detiene de inmediato

La respuesta correcta es: La velocidad angular disminuye con el tiempo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un objeto que gira y reduce su velocidad angular con el tiempo realiza:

Seleccione una:

- ☐ a. Un movimiento rectilíneo
- ☒ b. Un movimiento circular uniformemente retardado ✓
- ☐ c. Un movimiento con aceleración nula
- ☐ d. Un MCU con aceleración positiva

La respuesta correcta es: Un movimiento  lar uniformemente retardado

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad de aceleración angular en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. Grados por segundo
- ☐ b. Metros por segundo cuadrado
- ☒ c. Radianes por segundo al cuadrado (rad/s^2) ✓
- ☐ d. Radianes por segundo (rad/s)

La respuesta correcta es: Radianes por segundo al cuadrado (rad/s^2)

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con la velocidad angular en el MCUV?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumenta o disminuye linealmente con el tiempo ✓
- ☐ b. Permanece constante
- ☐ c. Se anula en todo instante
- ☐ d. Cambia aleatoriamente

La respuesta correcta es: Aumenta o disminuye linealmente con el tiempo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular?

Seleccione una:

- ☐ a. $v = \omega / r$
- ☐ b. $v = r / \omega$
- ☒ c. $v = \omega \cdot r$ ✓
- ☐ d. $v = \alpha \cdot t^2$

La respuesta correcta es: $v = \omega \cdot r$

