

CASO CLÍNICO

Paciente de 57 años de edad que hace 8 meses sufrió caída desde su propia altura, fue llevada a la clínica y se le diagnosticó fractura intertrocanterea izquierda, se le realizó osteosíntesis con placas y tornillo DHS. De género femenino, casada, etnia blanca, dominancia izquierda, procedente de Medellín, lenguaje primario español, realizó secundaria completa y estudios universitarios. Actualmente reside en Cali debido a que fue trasladada por cuestiones laborales ya que es profesora de idiomas en una Institución educativa de la ciudad, ingresa a la terapia caminando con bastón, acompañada por su esposo. Vive en un tercer piso de una unidad residencial sin ascensor. Refiere que su salud es muy mala después de haber sufrido el accidente, que casi no puede caminar con la fluidez de antes. Permanece la mayor parte del tiempo sentada, ha empezado a referir dolor en la cadera derecha. Recibe ayuda para algunas actividades de la vida diaria principalmente para el baño donde requiere que le pasen los implementos de aseo. Refiere episodios depresivos frecuentes cuando ve que no puede hacer las cosas como las hacía antes. No le gusta participar en actividades sociales fuera de la casa y en su tiempo libre mira programas de TV. Fumó desde los 18 hasta el día del accidente (1 cajetilla cada 2 días, desde los 25 años), con antecedentes de hipertensión arterial, no realizó ni realiza ejercicio. Los fines de semana se alimentaba con comidas rápidas. Al examen físico se encontró debilidad muscular generalizada en ambos miembros inferiores, de predominio el lado izquierdo, la movilidad articular de la cadera esta disminuida para la todos los movimientos (Flexión, extensión, abducción y rotaciones), en rodilla completa la extensión, pero la flexión está en 110 °, deambula con una marcha tipo Trendelenburg (marcha por debilidad de los músculos abductores de cadera izquierda), esta alterado el balance y el equilibrio, la cicatriz de la cirugía está sana, con signos de adherencia. Presenta signos leves de disnea y tos crónica. Paciente que se muestra ansiosa y muy temerosa al momento de aplicar las pruebas.