# 第一章 矩阵

# 1.1 求高次幂

1. 设 
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{pmatrix}$$
,  $B$  为 3 阶矩阵, 满足  $BA = O$ , 且  $r(B) > 1$ , 则  $A^n = \underline{\hspace{1cm}}$ .

1.1 求高次幂 2

1.1 求高次幂 3

3. 设 
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$
  $P$  为 3 阶可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$ , 则  $(B + E)^{100} =$ \_\_\_\_\_

1.2 逆的判定与计算

4 

# 1.2 逆的判定与计算

- 4. 设 n 阶矩阵 A 满足  $A^2 = 2A$ , 则下列结论不正确的是:
  - (A) A 可逆
- (B) A E 可逆 (C) A + E 可逆 (D) A 3E 可逆

- 5. 设 A, B 为 n 阶矩阵, a, b 为非零常数. 证明:
  - (a) 若 AB = aA + bB, 则 AB = BA;
  - (b) 若  $A^2 + aAB = E$ , 则 AB = BA.

6. 
$$\[ \mathcal{C} A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix} \]$$
  $\[ \] \mathbb{A} \mathbb{A}^3 = O. \]$ 

- (a) 求 a 的值;
- (b) 若矩阵 X 满足  $X XA^2 AX + AXA^2 = E$ , 求 X.

#### 1.3 秩的计算与证明

#### Remark. 秩的性质

- (1) 设 A 为  $m \times n$  阶矩阵, 则  $r(A) < \min\{m, n\}$
- $(2) r(A+B) \le r(A) + r(B)$
- $(3) r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$
- $(4) \max\{r(A), r(B)\} \le r(A \mid B) \le r(A) + r(B)$
- (5)  $r(A) = r(kA)(k \neq 0)$
- (6) 设 A 为  $m \times n$  阶矩阵,P 为 m 阶可逆矩阵,Q 为 n 阶可逆矩阵, 则 r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)
- (7) 设 A 为  $m \times n$  阶矩阵, 若 r(A) = n 则 r(AB) = r(B), 若 r(A) = m 则 r(CA) = r(C)
- (8)  $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$
- (9) 设 A 为  $m \times n$  阶矩阵, B 为  $n \times s$  阶矩阵, AB = 0, 则  $r(A) + r(B) \le n$ 
  - 7. (2018, 数一、二、三) 设 A,B 为 n 阶矩阵,(XY) 表示分块矩阵, 则:
    - (a) r(A AB) = r(A)
    - (b) r(A BA) = r(A)
    - (c)  $r(A B) = \max\{r(A), r(B)\}$
    - (d)  $r(A B) = r(A^T B^T)$

- 8. 设 A 为 n 阶矩阵, 证明:
  - (1) <math> $A^2 = A, \ \mathbb{M} \ r(A) + r(A E) = n.$
  - (II) 若  $A^2 = E$ , 则 r(A + E) + r(A E) = n.

### 1.4 关于伴随矩阵

Remark. 伴随矩阵的性质

(1) 
$$AA^* = A^*A = |A| \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*, A^* = |A|A^{-1}$$

$$(2) (kA)^* = k^{n-1}A^*$$

$$(3) \ (AB)^* = B^*A^*$$

$$(4) |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(5) (A^T)^* = (A^*)^T$$

(6) 
$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$$

$$(7) (A^*)^* = |A|^{n-2} A$$

(8) 
$$r(A) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

9. 设 n 阶矩阵 A 的各列元素之和均为 2, 且 |A|=6, 则  $A^*$  的各列元素之和均为:

$$(A)$$
 2

(A) 2 (B) 
$$\frac{1}{3}$$
 (C) 3

$$(C)$$
 3

1.4 关于伴随矩阵 10

10. 设  $A = (a_{ij})$  为  $n(n \ge 3)$  阶非零矩阵, $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式,证明:

(a) 
$$a_{ij} = A_{ij}(i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = A^T \Leftrightarrow AA^T = E \perp |A| = 1;$$

(b) 
$$a_{ij} = -A_{ij}(i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = -A^T \Leftrightarrow AA^T = E \perp |A| = -1.$$

#### 1.5 初等变换与初等矩阵

Remark. 初等变换与初等矩阵的性质

- (1) |E(i,j)| = -1, |E(i(k))| = k, |E(ij(k))| = 1
- (2)  $E(i,j)^T = E(i,j), E(i(k))^T = E(i(k)), E(ij(k))^T = E(ji(k))$
- (3)  $E(i,j)^{-1} = E(i,j), E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k})), E(ij(k)^{-1}) = E(ij(-k))$
- (4) 初等行(列)变换相当于左(乘)对应的初等矩阵
- (5) 可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积
- 11. (2005, 数一、二) 设 A 为  $n(n \ge 2)$  阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得到矩阵 B, 则:
  - (A) 交换 A\* 的第 1 列与第 2 列, 得 B\*
  - (B) 交换  $A^*$  的第 1 行与第 2 行, 的  $B^*$
  - (C) 交换  $A^*$  的第 1 列与第 2 列, 得  $-B^*$
  - (D) 交换 A 的第 1 行与第 2 行, 得  $-B^*$

12. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{III } (P^{-1})^{2023} A(Q^T)^{2022} = \underline{\hspace{1.5cm}}.$$