



## Plantilla de Reporte de Insights

**Pregunta 1: ¿Cómo evolucionaron los casos de dengue en Argentina entre 2022 y 2025?**

| SECCIÓN                            | CAMPO DE REGISTRO       | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen Ejecutivo del Hallazgo     | ID del Insight:         | INS-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Título Descriptivo:     | 2024 concentró el mayor brote de dengue del período 2022–2025                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Categoría:              | Evolución temporal / Tendencia epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contexto y Evidencia Estadística   | Patrón Identificado:    | Los casos de dengue muestran una evolución creciente entre 2023 y 2024, alcanzando su punto máximo en 2024. Ese año hubo 582.256 casos sobre un total nacional de 747.614. El pico más alto se observó en la semana epidemiológica 12 de 2024, con 71.967 casos. En 2025 se observa una reducción marcada respecto de 2024. |
|                                    | Variable(s) Crítica(s): | cantidad_casos+año+semanas_epidemiologicas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Grado de Confianza:     | Alto — el dataset contiene registros epidemiológicos nacionales continuos entre 2022 y 2025.                                                                                                                                                                                                                                |
| El Insight (Conocimiento Profundo) | Interpretación:         | El comportamiento temporal evidencia una aceleración marcada de los casos durante 2024, especialmente durante el primer trimestre del año. La concentración de casos en pocas semanas epidemiológicas sugiere una fuerte estacionalidad del brote y permite identificar un período crítico.                                 |



Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina  
Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

|                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <b>Impacto Potencial:</b> | El análisis temporal permite identificar semanas de mayor concentración de casos dentro del dataset, comparar el comportamiento entre años y detectar picos epidemiológicos con evidencia estadística. Esto valida que las visualizaciones seleccionadas curva epidémica por semana y evolución anual responden correctamente a la pregunta de investigación y permiten comparar la magnitud de los brotes entre años con datos concretos. |
| <b>Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)</b> | <b>Acción Propuesta</b>   | Continuar el análisis temporal incorporando métricas derivadas como variación interanual, promedio semanal de casos y detección de semanas pico, manteniendo la agrupación por año y semana epidemiológica como eje principal del análisis                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | <b>Prioridad:</b>         | Prioridad: Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | <b>Sprint Futuro</b>      | Incorporar variables climáticas (temperatura, humedad, precipitaciones) para evaluar su correlación con el pico estacional observado en SE 10–15. Resolver la cobertura incompleta de 2022 (solo SE 4–50, 30 semanas) para no subestimar comparaciones interanuales.                                                                                                                                                                       |



**pregunta 2: ¿Qué provincias y departamentos registraron mayor incidencia de casos?**

| SECCIÓN                            | CAMPO DE REGISTRO       | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen Ejecutivo del Hallazgo     | ID del Insight:         | INS-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Título Descriptivo:     | Tres provincias concentran casi la mitad de los casos nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | Categoría:              | Tendencia territorial / Distribución epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contexto y Evidencia Estadística   | Patrón Identificado:    | Buenos Aires, Córdoba y Tucumán acumulan el 45% del total de casos registrados entre 2022 y 2025, con una aceleración explosiva en 2024. Buenos Aires: 120.688 casos, Córdoba: 115.878, Tucumán: 109.179.<br>El resto de las 21 provincias reparte el 55% restante de manera muy desigual.<br>Total nacional: 747.614 casos.               |
|                                    | Variable(s) Crítica(s): | provincia_nombre +<br>cantidad_casos + año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Grado de Confianza:     | <b>Alto</b> — el dataset cubre las 24 provincias y CABA con registros semanales continuos entre 2023 y 2024.                                                                                                                                                                                                                               |
| El Insight (Conocimiento Profundo) | Interpretación:         | La concentración no sigue únicamente a la densidad poblacional: Tucumán (109.179 casos) supera ampliamente a CABA (37.825 casos) siendo mucho menos poblada. Este patrón sugiere que sin datos de población no es posible comparar provincias en igualdad de condiciones, lo que limita las conclusiones territoriales del dataset actual. |



Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina  
Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

|                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <b>Impacto Potencial:</b> | El patrón territorial identificado en el dataset muestra una distribución de casos que no es proporcional a la población de cada provincia. Incorporar datos de densidad poblacional al dataset permitiría transformar los valores absolutos en tasas de incidencia comparables, fortaleciendo la robustez del análisis y la validez de cualquier conclusión territorial. |
| <b>Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)</b> | <b>Acción Propuesta</b>   | Solicitar o incorporar al dataset una variable de población por provincia (fuente: INDEC) para calcular la tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Esto permitiría comparar provincias en igualdad de condiciones y determinar si la concentración de casos en Tucumán y NOA responde a mayor exposición o a menor subregistro.                                        |
|                                                          | <b>Prioridad:</b>         | Prioridad: [ Crítica]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | <b>Sprint Futuro</b>      | Sí — incorporar datos de densidad poblacional por provincia para calcular tasa de incidencia por 100.000 habitantes y comparar provincias en igualdad de condiciones.                                                                                                                                                                                                     |



**Pregunta 3: ¿Cómo se distribuyen los casos por grupo etario en el período analizado?**

| SECCIÓN                            | CAMPO DE REGISTRO       | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen Ejecutivo del Hallazgo     | ID del Insight:         | INS-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Título Descriptivo:     | Distribución de casos de dengue por grupo etario en Argentina (2022–2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Categoría:              | Comportamiento poblacional / Tendencia epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contexto y Evidencia Estadística   | Patrón Identificado:    | Los casos se concentran en grupos de edad media y adulto joven, con un pico marcado en 2024. El grupo de 45–65 años lidera con 163.425 casos (21,9% del total), seguido por 25–34 y 35–44 años. En conjunto, los adultos entre 25 y 65 concentran el 57,2% de los casos nacionales, mientras que los menores de 15 y mayores de 65 presentan incidencia significativamente menor   |
|                                    | Variable(s) Crítica(s): | grupo_edad_desc (segmentado en intervalos), cantidad_casos (agregada por grupo etario y año), año (comparación temporal).                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Grado de Confianza:     | <b>Alto</b> — dataset nacional validado, cobertura completa de grupos etarios y provincias.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El Insight (Conocimiento Profundo) | Interpretación:         | El patrón etario es consistente entre años: los adultos concentran la mayoría de los casos, mientras que menores y mayores muestran baja incidencia. La mayor exposición de los grupos activos laboral y socialmente sugiere que movilidad y condiciones urbanas son factores clave en la transmisión, reforzando la predominancia de los segmentos de 25 a 65 años en el dataset. |



Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina  
Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

|                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <b>Impacto Potencial:</b> | Diseñar estrategias de comunicación y control vectorial específicas para grupos de edad media y joven adulto antes del período crítico (SE 10–15). .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)</b> | <b>Acción Propuesta</b>   | Diseñar estrategias de comunicación y control vectorial específicas para grupos de edad media y joven adulto antes del período crítico (SE 10–15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | <b>Prioridad:</b>         | <b>Alta</b> — el hallazgo permite identificar los grupos etarios con mayor riesgo de transmisión y orientar acciones preventivas específicas antes del período crítico (SE 10–15). Su aplicación directa en políticas de salud pública justifica su tratamiento prioritario en el próximo ciclo de análisis.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | <b>Sprint Futuro</b>      | Incorporar variables sociodemográficas (ocupación, nivel educativo, movilidad urbana) y climáticas para profundizar correlaciones entre condiciones ambientales y comportamiento epidemiológico. Dado que el dataset actual no contiene estas variables, se recomienda integrar fuentes externas como INDEC (ocupación y educación), Google Mobility Reports (movilidad urbana) y SMN (condiciones climáticas). Esta ampliación permitirá evaluar impacto diferencial y enriquecer el análisis predictivo en próximos ciclos |