

MESOZOICO

Estado Yaracuy

Referencia original: J. Bushman, 1959, p. 77.

Consideraciones históricas: Bushman (1965) introduce el nombre informal de "[Esquisto verde de Agua Viva](#)", para referirse a una secuencia de rocas metamórficas que rodean a sus "rocas intrusivas básicas de La Bimba". Martín y Bellizzia (1967) se refieren a estas rocas en la descripción de la "Peridotita Serpentinizada de La Bimba". Añez *et al.* (1979) describen y cartografían esta unidad como parte de su trabajo sobre el depósito de talco y esteatita de Cabimba.

Localidad tipo: A 3 km al suroeste del poblado de Agua Viva, a su vez a 15 km al sureste de la población de Yaritagua, estado Yaracuy. Hoja 6345, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Bushman (1965) señala la presencia de esquisto verde, esquisto calcáreo - grafitoso, esquisto micáceo y mármol. Añez *et al.* (1976) en su estudio del depósito de talco, describe esta unidad señalando que se ha formado como consecuencia de fallamiento e hidrotermalismo, que ha generado una extensa zona de contacto ubicada entre la "Peridotita serpentizada de La Bimba" y las rocas esquistosas de las formaciones Aroa y Nirgua (sin diferenciar). Indica que está constituida por esquisto verde, áreas de alteración, esquisto cuarzo - micáceo y mármol en cuerpos delgados. Adicionalmente menciona zonas con minerales asbestiformes, áreas cloríticas, niveles actinolíticos y depósitos de esteatita. Interpretan esta unidad como típica de la zonación alrededor de zonas de metasomatismo de rocas ultramáficas con su interacción con rocas silíceas.

Extensión geográfica: Los afloramientos se extienden en una franja en dirección este - oeste por unos 6 km, únicamente en el sector de su localidad tipo, estado Yaracuy, y alrededor de la unidad denominada "Peridotita serpentizada de La Bimba".

Contactos: Se encuentra en contacto concordante con las unidades adyacentes, que son la Peridotita Serpentinizada de La Bimba descrita por Martín y Bellizzia (1967), y rocas esquistosas atribuidas a las formaciones Nirgua y Aroa sin diferenciar por Añez *et al.* (1979).

Edad: Se desconoce, pero se presume una edad Mesozoica.

Correlación: No se ha correlacionado con ninguna otra unidad. Importancia Económica: La alteración del cuerpo de serpentina que es rodeado por esta unidad, ha formado un importante depósito de talco, e igualmente dentro de ella hay zonas de este mineral (Añez *et al.*, 1976).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Añez, G.; S. Rodríguez; D. Rodríguez; C. Velasco y N. Torrealba, 1976. Depósito de esteatita de Cabimba, estado Yaracuy. Génesis, caracteres geológicos y evaluación de reservas probables. *Bol. Geol.*, Caracas., 13(25): 155-196.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area. A summary report. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, 2(4): 65-84.

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 311-336.

Martín Bellizzia, C. y A. Bellizzia, 1967. Peridotita serpentizada de La Bimba y yacimientos de talco asociados, Yaritagua, estado Yaracuy. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 273-287.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-563.

Von Der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del estado Lara, región de Quibor (Carta 2.308), *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)