




CRETACICO (Maastrichtiense)

Colombia

Referencia original: F. A. Sutton, 1946, p. 1656.

Cushman y Hedberg (1941) establecieron la Zona de *Ammobaculites colombianus* en la región de la Concesión Barco, Departamento Santander del Norte, Colombia; la unidad abarca a la Formación

Mito Juan y parte superior de la Formación "Orocué". El nombre de la especie titular fue modificado posteriormente a *Ammomarginulina colombiana*, término empleado por Sutton (1946) para designar la zona. Fue llamada *Ammotium colombianum* por Key (1960) en la Formación Mito Juan de los pozos de Alturitas, estado Zulia. Su abundante fauna de foraminíferos bentónicos se caracteriza por formas arenáceas, principalmente *Ammomarginulina colombiana* y *Haplophragmoides excavata*; las formas calcáreas, más escasas, incluyen *Plnularia dissona* var. *santanderensis*, *Vaginulina navarroana*, *Gümbelitra cretácea*, *Siphogenerinoides parva*, *Gavelinella* sp. cf. *G. Nelsoni*, y *Cibicides coonensis*; estas dos últimas se restringen a la parte superior de la zona. La unidad se atribuye al Maastrichtiense Tardío y se reconoce en toda la parte sur de la cuenca del lago de Maracaibo, desde Santander del Norte (Colombia) y el estado Táchira hasta Machiques y los campos petrolíferos del lago de Maracaibo, estado Zulia.

Referencias

Cushman, J. A. y H. D. Hedberg, 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17-1(224): 1-27.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo en Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., III: 511-545.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Pet. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)