

TERCIARIO (Paleoceno-Eoceno Medio)

Estado Lara

Referencia original: N. G. Muñoz, 1966, p. 140.

Consideraciones históricas: Renz (1960) y Caudri (1960) mencionaron brevemente los pequeños arrecifes aislados del Paleoceno-Eoceno Temprano que afloran sobre los bordes de la Plataforma de Barbacoas en la región de El Tocuyo-Humocaró Bajo, estado Lara, en los límites entre las Formaciones Humocaró-Quebrada Arriba y la Formación Morán. Muñoz (1966, p. 140) fue aparentemente el primero en mencionar "la línea oblicua de arrecifes de El Guamo a Berlín". González de Juana *et al.* (1980, p. 453-454) refieren a las masas arrecifales de El Guamo y Berlín como cambios laterales de la Formación Humocaró, e identifican a *Venericardia* cf. *planicosta* (del Paleoceno) en la base del arrecife de Berlín. Con la presencia de *Actinosiphon* cf. *barbadensis* y *Eoconuloides wellsi* en la Formación Quebrada Arriba, Muñoz (*op. cit.*) ubica esa formación en el Eoceno temprano.

Aguasuelos (1990 en Kiser, 1997) contribuyeron con identificaciones paleontológicas que llevan la edad del arrecife, y consecuentemente la edad de la secuencia Humocaró-Quebrada Arriba, al Eoceno medio, parte inferior. De la parte inferior del arrecife identificaron: *Discocyclina citrensis*, *Actinosiphon barbadensis*, *Operculinoides soldadensis* y *Heterostegina soldadensis*. De la parte superior: *Venericardia* cf. *bermudezi*, *Campanile* cf. *breve*, *Discocyclina* sp., *Pitaria negritensis*, *Turritella* cf. *nerinexa*, *Discocyclina grimsdalei* y *Operculinoides* sp.

Su extensión geográfica se restringe al área de la sección tipo. Desconocen a su contacto inferior; su contacto superior es normal y brusco con las lutitas de El Cercado. Para la unidad, indican un ambiente de plataforma interna y alta energía. Estimaron un espesor máximo de 450 m para la unidad.

Véanse [HUMOCARÓ, Formación](#); [QUEBRADA ARRIBA, Formación](#).

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Caudri, C. M. B., 1961. Some remarks on the ferruginous interval in the Eocene section of Humocarobajo, Lara. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(9): 285-287.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Kiser, G. D., 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos (Corpoven, S.A.) de Barinas y el frente de montaña*. En prensa, p. 19.

Muñoz J., N. G., 1966. Descripción de las formaciones Hurumaco y Quebrada Arriba en sus localidades tipo de Los Andes de Lara. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(5): 137-145.

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(6): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Renz, O., 1960-c. Geología de la parte sureste de la Península de la Guajira (República de Colombia). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 317-347.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)