

TERCIARIO (Mioceno)

Estado Zulia

Referencia original: M. W. Hass y R. G. Hubman, 1937-a, p. 133.

Hass y Hubman (1937-a, b) mencionaron la zonación de la "serie" La Rosa establecida por Hoffmeister en informes inéditos, y describieron brevemente la subzona de *Bolivina*, que difiere de la subzona de *Cibicides*, suprayacente, por la abundancia de los géneros *Bulimina* y *Sorites*, y presencia de varias especies de *Bolivina* y otros géneros de foraminíferos. Hoffmeister (1938-a, b) mencionó ambas subzonas como subdivisiones de la Zona de *Microdrillia*.

Véase [MICRODRILLIA, Zona de](#)

Referencias

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-a. Notas sobre la estratigrafía de los campos costaneros del Distrito Bolívar, Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 123-164.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-b. Notes on the stratigraphy of the Bolivar Coastal fields, Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min* (Venezuela), 1:(2-4): 113-155.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)