


**PRECAMBRICO TEMPRANO**

Estado Bolívar

Referencia original: B. Korol, 1965, p. 10.

Consideraciones históricas: En la región nororiente del estado Bolívar, se efectuaron diversos estudios geológicos relacionados con las explotaciones auríferas, iniciándose con el trabajo detallado de Duparc (1922), quien denominó rocas verdes de El Callao a la secuencia estudiada. Newhouse y Zuloaga (1929) introdujeron el nombre Serie Pastora para designar las rocas expuestas entre los pueblos de El Callao y La Pastora, cuya descripción fue ampliada posteriormente por Zuloaga (1930) y por Zuloaga y Tello (1939) con el rango de Grupo. Korol (1965) usa nuevamente el término Serie Pastora y la divide en las formaciones Yuruari, El Callao y Caballape, en secuencia ascendente. Menéndez (1968) en la región de Guasipati, separó la Formación Caballape, en la cual destacó el predominio de elementos volcánicos, de lo que él llamó Supergrupo Pastora, que lo infrayace con discordancia estructural.

Localidad tipo: Sabanas situadas a ambos lados de la quebrada Dividival, por 10 kilómetros de distancia hacia el norte a partir de su desembocadura en el río Caballape. Conservamos esta localidad tipo por su fácil acceso y porque en esta área se pueden observar las rocas y las estructuras sedimentarias que mejor caracterizan esta unidad; ya que es posible también observar una buena sección de ésta Formación en el río Cuyuní (sector isla de Anacoco), entre el sitio denominado Los Portones y el Rápido de Turumban (Benaím, 1972).

Descripción litológica: Korol (1965) describió lodolitas laminadas, limolitas y grauvacas de grano fino a medio, con algunos sedimentos conglomeráticos (hasta 10% de guijarros), con predominio de lodolitas y en la base describió capas características de jaspe rojizo, mediana a finamente estratificadas y a veces brechadas. Según Menéndez (1968) la descripción original no destaca los abundantes fragmentos volcánicos contenidos en la unidad y los jaspes de la base pertenecen en realidad a la Formación El Callao y las brechas son de origen tectónico y describió la litología como rocas epiclásticas volcánicas: limolitas, grauvacas y conglomerados (80%) y probables rocas piroclásticas: tobas y brechas (20%). Benaím (1972) describió rocas volcánicas en el río Botanamo en esta unidad: lavas, brechas y tobas de composición intermedia, interestratificadas con la secuencia de rocas epiclásticas volcánicas descritas por Menéndez (1968), quien destacó además la presencia de estructuras sedimentarias, que indican una sedimentación por corrientes de turbiedad, señalando que el conjunto litológico de esta unidad se presenta levemente metamorfizados.

Espesor: Korol (1965) mostró unos 8.000 m de espesor en su columna estratigráfica para esta unidad litológica. Menéndez (1968) señaló un espesor mínimo estimado de 5.000 metros para dicha unidad. Es importante mencionar que en el área de El Callao se conoce el contacto superior de la Formación. Benaím (1972), describe este contacto en el río Botanamo, donde la Formación Caballape se presenta infrayaciendo concordantemente a la Formación Los Caribes y en el río Venamo (Benaím, 1997) donde esta unidad pasa transicionalmente hacia arriba a la Formación Venamo y la Formación Caballape, presenta un espesor estimado de 7.000 m.

Extensión geográfica: La unidad aflora en las zonas axiales de los sinclinales abiertos en los alrededores de El Callao, donde fue descrita originalmente y aflora extensamente al este, noreste, sur y sureste de dicha población, en especial en la región fronteriza con la Zona en Reclamación (Guayana Esequiva), formando pliegues abiertos, con rumbo general este-oeste.

Contactos: Esta unidad litológica constituye la secuencia basal del Grupo Botanamo (Benaím 1972). Según Korol (1965), en las áreas donde no existen extrusiones de lavas, la unidad suprayace concordante y transicionalmente a la Formación Yuruari. Según Menéndez (1968) La Formación Caballape suprayace discordantemente tanto a la Formación El Callao, redefinida por el mismo Menéndez 1968, como a la Formación Yuruari. La discordancia se infiere por razones estructurales.

Edad: Precámbrico Temprano. Menéndez (1968, tabla 3) señaló la edad aproximada de 2.000 m.a. para las rocas del Complejo de Supamo, intrusivo en la Formación Caballape.

Correlación: McCandless (1966) correlacionó la Formación Caballape con la Formación Haimaraca del Grupo Mazaruni en Guyana (Zona en Reclamación). Menéndez (1968, 1972) la correlacionó con la Formación Cuyuní del Grupo Mazaruni.

Ambiente tectónico y petrogénesis: La unidad es producto de sedimentación en aguas profundas con volcanismo asociado riódacítico a andesítico de carácter calco-alcalino. Menéndez (1994) señaló que puede ser producto de depósito en cuencas orientadas este-oeste que dieron origen a cinturones de rocas verdes secundarios. USGS y TECMIN (1993) postularon su origen a partir de augeosinclinales no relacionado con la génesis de cinturones de rocas verdes.

© N. Benaím, 1997

Referencias

Benaím, N., 1972. Geología de la Región de Botanamo. Estado Bolívar. *IV Cong. Geol. Venez.*, 3: 1291-1314.

Benaím, N., 1997. Formación Venamo...

Duparc, L., 1922. Les roches verses et les filons de quartz aurifère du Callao au Vénézuéla. *Schweiz. Min. Pet. Mitt.*, Bd. II, p. 1-68.

Korol, B., 1965. Estratigrafía de la Serie Pastora en la región Guasipati-El Dorado. (Presentado Cong. Cent. Col. Ing. Venez., 1961). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 3-17.

Menéndez, A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la provincia de Pastora, según el estudio de la región de Guasipati, Guayana Venezolana, *Bol. Geol.*, 10(19): 309-338.

McCandless, G. L., 1966. Geología general de la parte septentrional del Escudo de Guayana en Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 140-153.

Newhouse, W. H. y G. Zuloaga, 1929. Gold deposits of the Guayana highlands. *Econ. Geol.*, 24(8): 797-810.

USGS y CVG TECMIN, 1993. Geology and mineral resource assesment of the Venezuelan Guayana Shield: *U.S. Geological Survey Bulletin 2062*, 121 p.

Zuloaga, G., 1930. Geología general de la Guayana venezolana. *Rev. Col. Ing. Venez.*, 6(69-74): 466-475.

Zuloaga, G. y M. Tello, 1939. Exploración preliminar de la Sierra de Imataca. *Rev. Fomento*, Caracas, 3(19): 397-430.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Perról., Bol. Inform., 8(11): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 29-104.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)