

**TERCIARIO** (Mioceno Temprano)

Trinidad

**Referencia original:** H. M. Bolli, 1957, p. 100.

Esta zona fue definida por Bolli (1957) en la Formación Cipero de Trinidad, y constituye la parte inferior de la anterior Zona de *Globigerinatella insueta* (*sensu lato*). Lamb (1964-b) la menciona en la Formación Carapita de Venezuela oriental, y Blow (1959) en la Formación San Lorenzo de Venezuela occidental. Su edad, aceptada generalmente, es Mioceno Temprano (Aquitaniense medio).

**Referencias**

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B. W. I., U. S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Lamb, 1964-b. The geology and paleontology of the río Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról. Bol. Inform.* 7(4): 111-123.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)