




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Distrito Federal

Referencia original: N. E. Weisbord, 1957, p. 12.

Weisbord (1957) introdujo este nombre para designar el miembro inferior de la Formación Playa Grande, compuesto de areniscas calcáreas y conglomerados en la base, algunas calizas, y lentes ocasionales de coquina, con un espesor de hasta 233 metros. La unidad es discordante sobre la Formación Las Pailas. Según Weisbord (1962), las relaciones con el Miembro Maiquetía suprayacente no son claras por no aflorar una sección continua donde se observe el contacto, y se deducen a partir de los contactos basal del Miembro Catia sobre la Formación Las Pailas, y superior del Miembro Maiquetía por debajo de la Formación Mare. Weisbord (1962, 1964-a) mencionó 6 especies de gasterópodos y 26 de pelecípodos entre las faunas fósiles de la unidad, con buena representación de *Lyropecten arnoldi*.

Véase [PLAYA GRANDE, Formación](#).

Referencias

Weisbord, N. E., 1957. Notes on the geology of the Cabo Blanco area, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 38(165): 5-25.

Weisbord, N. E., 1962. Late Cenozoic gastropods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672

Weisbord, N. E., 1964a. Late Cenozoic pelecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.* 45(204): 564.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)