




PALEOZOICO (Cámbrico Tardío-Devónico)

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín Bellizzia, 1951, p. 1466.

Consideraciones históricas: Martín Bellizzia (1961) utilizó este nombre, para designar el nivel intermedio del Grupo El Barbasco, que aflora en la región norte-central y centro-oriental del macizo de El Baúl. Anteriormente, las rocas metamórficas sin diferenciar (hoy Grupo El Barbasco), a las que pertenece esta unidad, habían sido mencionadas por Liddle (1928 y 1946), por Bucher (1952) y por Rod (1955), y habían sido descritas genéricamente por Feo-Codecido (1955).

Localidad tipo: Area Cerrajón-Cerrillo en las estribaciones meridionales de la fila de Los Novillos, macizo de El Baúl, distrito Girardot, estado Cojedes. Hojas 6542 y 6543, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El nivel inferior de la formación corresponde al Miembro Jobito, constituido por una asociación de metalimolitas, filitas, cuarcitas, con rizaduras deformadas, esquistos clorítico-cuarzosos y cuarcitas masivas, que presentan colores gris verdoso, verde blanquecino, rojo amarillento y violáceo. Los niveles medio y superior están esencialmente formados por hornfelses pelíticos, (muscovita, cuarzo, andalusita) de color verde rojizo, densos, afaníticos e intensamente diaclasados, en las que se presentan horizontes de cuarcitas sacarinas (cuarzo, sericita, clorita) de gran espesor y persistencia, sobre todo hacia el tope de la formación. Estas últimas son de color blanco crema y meteorizan a rojo amarillento; poseen lechos de cuarcita negra, a las que el metamorfismo de contacto ha alterado a una roca densa y oscura (cornubianita), moteada de blanco, rica en feldespato sódico y en turmalina. El nivel superior de la formación fue intrusionado por diques de riolita esferulítica, de hasta 5 m de espesor y de color blanco verdoso.

Estos metasedimentos pelíticos (90%) y samíticos (10%) sufrieron un metamorfismo regional de bajo grado de la facies de los esquistos verdes, zona de la muscovita-clorita. Con la intrusión granítica, se superpone un metamorfismo de las metapelitas y metasamitas en porcelanitas, filitas maculosas, cornubianitas (hornfelses) y cuarcitas micáceas esquistosas.

Espesor: Se midieron unos 1.000 m, de los cuales le corresponden unos 300 m al Miembro Jobito.

Extensión geográfica: Esta unidad representa el 60% del área metamórfica, y constituye el núcleo montañoso centro-oriental del macizo de El Baúl, estado Cojedes.

Contactos: Según Martín Bellizzia (*op. cit.*), la formación Cerrajón representa un techo colgante sobre la intrusión granítica. Su contacto inferior con la Formación Mireles es concordante y gradacional, y el contacto superior con la Formación Cañaote, es concordante y transicional.

Fósiles: No se mencionan fósiles de esta unidad.

Edad: Por su posición estratigráfica entre la Formación Mireles del Cambro-Ordovícico y la Formación Cañaote, de edad posiblemente Ordovícico, se le asigna una edad del Cámbrico Superior al Ordovícico.

Correlación: Martín Bellizzia (*op. cit.*) correlaciona esta formación con las formaciones Carrizal y Hato Viejo, del subsuelo meridional de la cuenca Oriental, y cronológicamente, con la sección superior de la Formación Caparo de los andes de Venezuela.

Paleoambiente: El ambiente de sedimentación de esta Formación, corresponde a la de una plataforma inestable, regresión de los mares, con ambiente oxidante en condiciones continentales.

© P. Moticska N., 1997

Referencias

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, p.113.

Feo-Codecido, G., 1955. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. (Venezuela)* 3(8): 109-121.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. Mac Gowan, Fort Worth, Texas, p. 552.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2da. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, p.890.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. Publ. Esp.* N° 3, 4: 1453-1530.

Rod, E., 1955: Trilobites in "metamorphic" rocks of El Baúl, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 39(9): 1865-1869.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Martín Bellizzia, C., 1960. Estudio petrográfico de rocas provenientes de los cerros El Rodeo, Tausabana y Santa Ana. *III Cong. Geol. Venez.*, Mem., Caracas, 1959, 2: 729-742.

Stover, L. E., 1967. Palynological dating of the Carrizal Formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 288-302.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)