

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Falcón

Senn (1935) y Liddle (1946) emplearon respectivamente los nombre de lutitas de Cerro Campana (Cerro Campana Schichten), capas de Cerro Campana y Formación Cerro Campana, para designar un intervalo lutítico con intercalaciones arenosas y una caliza orbitoidal, hoy incluidos en la Formación Guacharaca.

Véanse [CERRO CAMPANA, Caliza de](#) y [GUACHARACA, Formación](#).

Referencias

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, New York, 890 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Gorter, N. E. y I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.*, 4(2): 94-122.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela, *Smithsonian Misc. Coll.*, 89(11): 44.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

	
1a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)