




CRETACICO (Albiense)

Estado Sucre

Referencia original: F. G. Yoris V., 1985.

Consideraciones históricas: Este término fué utilizado por Yoris (1985), para designar la parte inferior del Formación Chimana que aflora en la región del río Putucual, al este de Casanay, y por su litología, corresponde al concepto original con que fue definida la Formación Chimana, en la isla de Chimana Grande, por Hedberg y Pyre (1944). Su sección tipo fué propuesta por Yoris (1985, 1988) en la sección que corta el río Putucual, en base a la información de los tesisistas del Departamento de Geología de la UCV que trabajaron en la región entre 1976-1978. La litología que lo caracteriza, es predominantemente lutítica-margosa glauconítica, con intercalaciones de calizas oscuras microfósilíferas.

Infrayace concordantemente al Miembro Putucual en la misma región, y puede ser lateralmente equivalente en edad, a la parte superior de la Formación El Cantil, de otras zonas al sur de la Serranía del Interior, y a la parte inferior de la Formación Chimana (Miembro Caripe). Su extensión hacia el este de la región tipo, aún no ha sido estudiada. Es posible que esta unidad corresponda a la parte inferior de la Formación Cutacual de Metz (1965), la cual Yoris (1985, 1988), propuso desechar como término formal, por ser un sinónimo innecesario de la Formación Chimana en esta región. La edad del Miembro Chimana Grande se estima en Albiense temprano, por su correlación directa con las facies de la Formación Chimana, en la Serranía del Interior y por su posición estratigráfica infrayaciendo al Miembro Putucual, perteneciente también a la misma formación.

Véase [CHIMANA, Formación](#).

© **Franklin G. Yoris V., 1997**

Referencias

Hedberg, H. y Pyre, A., 1944. Stratigraphy of northeastern. Anzoategui, Venezuela. *Am. Asoc. Petról. Geol. Bull.*; 28(1): 1-28.

Metz, H. L., 1965. Definition of the Cutacual Formation. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*; Bol. Inf. 8(4): 107-109.

Yoris, F. G., 1985. Revisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; Rios, J. H. y Bellizzia, N. P. de (Eds.) *IV Congreso Geológico Venezolano, Soc. Ven. Geol.*; Caracas; Memoria 2: 1343-1393.

Yoris, F. G., 1988. Localidades tipo para los miembros de la Formación Chimana den la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geól.*, Caracas (en prensa).

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)