


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: A. Menéndez V. de V. 1968, p. 325.

Consideraciones históricas: Menéndez (1968), introduce el término Formación Cicapra para designar una unidad, compuesta esencialmente por rocas volcanoclásticas de composición básica, que

suprayace a la Formación El Callao, con la cual constituye el Grupo Carichapo, e infrayace en contacto transicional a la Formación Yuruari. Menéndez (1994) define la tendencia de cristalización comatiítica - toleítica de las volcánicas de la unidad.

Localidad tipo: Río Yuruari; sector comprendido entre un punto situado a 500 metros de distancia al este del Paso Morichito y otro a un kilómetro al este de la quebrada Cicapra, estado Bolívar. Hoja de Cartografía Nacional N° 7738 escala 1:100.000, Municipio Autónomo Roscio del estado Bolívar.

Descripción litológica: Según Menéndez (1968; 1994), tiene una litología distintiva de esquistos anfibólicos (80%) derivados de brechas y tobas de composición basáltico-comatiítica, y de lodolitas, areniscas y conglomerados grauváquico-volcánicos, muy pobres en cuarzo. Los conglomerados y las brechas son usualmente de estratificación espesa y están constituidos de fragmentos de lavas máficas y ultramáficas con afinidades comatiíticas, en una matriz rica en blastocristales de anfíbol aparentemente pseudomorfos de piroxeno. Las lodolitas y arenisca son de estratificación delgada. Localmente se intercalan en la secuencia, basaltos comatiíticos y jasperoides recrystalizados (cuarcitas manganesíferas y ferruginosas). La unidad está intrusionada por sills y diques de pórfido de cuarzo y felsitas, más abundantes cerca de los plutones de Mandingal y Cerro Pelón que también intrusionan a la unidad. Presenta metamorfismo en la facies de los esquistos verdes; aumentando el metamorfismo hacia el norte y noreste de Guasipati a la facies de la anfibolita.

Espesor: Se ha estimado un espesor mínimo de 2.000 metros en la sección tipo (Menéndez, 1968, 1972).

Extensión geográfica: La unidad aparentemente está restringida a la parte oeste del cinturón de rocas verdes de Guasipati (Menéndez 1994), ya que no ha sido identificada todavía en otra localidad. Alcanza su mejor desarrollo en la sección tipo, y al sureste del pueblo La Pastora, se reconoce al norte de Guasipati (en las proximidades de los cuerpos graníticos); se acunian hacia el sur-sureste; no afloran en los alrededores de El Callao.

Edad: Según se deduce de los estudios de Klar (1978, en Menéndez, 1994) la edad mínima de la unidad es de 2200 ± 100 m. a. que es la edad isotópica definida en pórfidos de cuarzo que la intrusionan.

Contactos: La unidad es infrayacente a la Formación Yuruari con contacto transicional y suprayacente a la Formación Florinda en los lugares donde la Formación El Callao está ausente (Menéndez, 1994). La relación entre Cicapra y El Callao es desconocida; sin embargo, al estar ambas unidades en la misma posición estratigráfica, pero en localidades diferentes, ello sugiere una relación lateral de interdigitación. En Cicapra se encuentra coladas de lava basáltica toleíticas que podrían representar a El Callao, pero en esta última no se encuentran rocas similares a las contenidas en Cicapra, tales como las epiclásticas volcánicas ricas en fragmentos de rocas con afinidad comatiítica.

Correlación: No se ha establecido correlación con otras unidades.

Importancia económica: La unidad está asociada a mineralización aurífera. Además ofrece buenas perspectivas para la prospección de metales básicos.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Menéndez (1994) sugirió que la génesis de la secuencia estratigráfica representada por el Supergrupo Pastora, del cual forma parte la unidad, pudo haber sido producto de actividad volcánica fisural en corteza oceánica sin intervención de corteza siálica, a lo largo de cuencas, con un patrón primario norte-sur a N 10° E (Patrón del cinturón de rocas verdes de Guasipati), en el marco de la evolución de los cinturones de rocas verdes primarios de la Provincia Geológica de Pastora.

Referencias

Gibbs, A. K. y W. I. Olszewski, 1982. *Circón U-Pb Ages of Guayana greenstone - Gneises tarrane: Precambrian Research*. 17: 199-214.


Klar, G., 1979. Geochronology of the El Manteco Guri and Guasipati áreas Venezuela Yuidna Shield: Unpublished PhD. Dissertation, *Case Western Reserve University*, p. 177

Menéndez V. de V., A., 1968. Revisión de la Estratigrafía de la Provincia de Pastora Según el estudio de la Región de Guasipati, Guayana Venezolana. *IV Congreso Geol. Venez.*, Caracas 1.969. MEM., IV: 2001-2246.

Menéndez V. de V., A., 1994. Cinturones de Rocas Verdes del Escudo de Guayana en Venezuela; Revisión Estratigrafica; III Simposio Internacional del Oro en Venezuela; *libro de Memorias Asociación Venezolana del Oro*. p. 123-139.

Sidder, G. B., 1995. *Geology and Mineral Deposits of the Venezuela Guayana Shield* USGS Bulletin 2.124.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)