

COROCOROTE, Miembro (Formación Caujarao)

INVALIDO

NEOGENO (Plioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: C. Gonzalez de Juana, 1937-a, p. 203.

Consideraciones históricas: Gonzalez de Juana (1937) hizo referencia a calizas impuras, conocidas como "Paquete de Corocorote" y lo colocó en la base de la Formación La Vela, en las localidades donde está desarrollada a Caliza de Cumarebo, de la Formación Caujarao, por debajo. Payne (1951) lo describió como el miembro superior de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo, indicando que se encuentra solo cuando está desarrollada la Caliza de Cumarebo, en contacto discordante sobre ella. Dusenbury (LEV I, 1956) indicó que esta discordancia es solo aparente y el contacto es interdigitado. Giffunni (1980) no lo reconoció en el área de Tocópero, incorporándolo a la Caliza de Cumarebo a la cual está íntimamente asociado. Debido a que este cuerpo de calizas está exclusivamente asociado a la Caliza de Cumarebo, de la cual es difícil de discriminar, se recomienda considerar el Miembro Corocorote de la Formación Caujaao como inválido. Gonzalez de Juana *et al.* (1980) la describe como un desarrollo de calizas detríticas, asociadas a arcillas glauconíticas, con fragmentos de Caliza de Cumarebo.

Localidad tipo: Cerro Corocorote Bajo, al suroeste del Campo Cumarebo, distrito Zamora, estado Falcón. Hoja N° 6350, Cartografía Nacional, escala 1:100.000.

Descripción litológica: Según Payne (1951), la unidad empieza con un intervalo de arcillas glauconíticas con fragmentos de la Caliza de Cumarebo, que pasa hacia arriba a calizas detríticas, limoníticas, muy fosilíferas, que son su litología distintiva. Tanto por encima de la caliza detrítica, como lateralmente reemplazando la arcilla glauconítica de la base, se encuentran capas de limos, arena y conglomerado fino.

Edad: Por su posición estratigráfica, se le asigna una Edad Mioceno Superior a Plioceno, sin diferenciar.

Espesor: No hay indicación de espesores en la literatura.

Contactos: Aunque Payne (1951) indica que los contactos, tanto inferior con la Caliza de Cumarebo, como superior con la Formación El veral, son discordantes, Dusenbury (LEV I, 1956) es de opinión que el contacto inferior es de interdigitación.

Fósiles: No hay indicación de fósiles en la literatura.

Edad: Considerando la posición estratigráfica del Miembro Corocorote, la edad del mismo debe considerarse Plioceno Temprano.

© E. Cabrera y G. Giffuni, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.

González de Juana, C., 1937. Geología General y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 1, 728 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Gamero, G. y Díaz de Gamero L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, Estado Falcón. "Geos", *Univ. Cent. Venez.*, Caracas. (9): 7-44. Reimpreso 1963 en: *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(11): 329-367.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Petzall, C. K. , 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10: 269-320.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiären orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und NordMarokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(1): 65-81.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)