

PRE-MESOZOICO

Estado Aragua

Referencia original: M. Wehrmann, 1972, p. 2103.

Consideraciones históricas: En nombre fue introducido informalmente por Wehrmann (1972). Fue cartografiado parcialmente por Rodríguez (1972) pero sin darle ninguna denominación específica. Ostos (1990) lo describe brevemente denominándolo "Granito de Colonia Tovar". Beck (1985, 1986, p. 311) lo denomina informalmente como "[Granito de El Limón](#)".

Localidad tipo: Cercanías del poblado de Colonia Tovar, estado Aragua. Hoja 6747, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Wehrmann (1972) lo describe como un gneis a veces bandeado, con una mineralogía compuesta de cuarzo (32,5%), feldespatos (35), muscovita (20), clorita (7,5), epidoto (3), hematita (2) y cantidades menores de granate, anfíbol, epidoto, calcita, apatito y zircón. Es de color blanco verdoso y grano uniformemente fino a medio, asociado a pegmatitas y aplitas. El feldespato potásico es ortosa sin maclar. Señala que la clorita debe proceder de la transformación de la biotita original.

Por su parte, Ostos (1990) lo describe como un gneis con porfiroclastos de feldespatos, mostrando raramente textura augengnéisica; está cruzado por abundantes vetas de cuarzo con un espesor máximo de 20 cm. La asociación mineralógica de estas rocas permite inferir que fueron sometidas a un metamorfismo de la facies de los esquistos verdes. El mismo autor indica que este gneis tiene más cuarzo y menos mica que el Augengneis de Peña de Mora.

Beck (1985, 1986, p. 311) señala que en el campo y en sección fina presenta semejanza con el "Granito de Choroni".

Extensión geográfica: Wehrmann (1972) lo ubica en su mapa en los alrededores de [Colonia Tovar](#), señalando afloramientos en el curso del río Grande y en el sitio denominado Tierra Blanca en la vía hacia El Junquito. Ostos (1990) señala afloramientos desde el Portón de la Colonia hasta Pié de Cerro.

Contactos: Ostos (1990, p. 55) señala que su contacto sur con la Formación Las Mercedes puede ser una falla normal de ángulo bajo o tal vez un contacto sedimentario. Por el contrario el contacto norte con la misma Formación es una falla de corrimiento.

Correlación: Wehrmann (1972) lo correlaciona con los granitos de Guaremal y Rancho Grande, Carabobo y Aragua. Ostos (1990) dice que pudiera ser correlacionable con el Augengneis de Peña de Mora, e igualmente señala que pudiera ser parte del basamento sobre el cual se depositó el Grupo Caracas.

Edad: A falta de edades radiométricas en estas rocas, por las correlaciones anteriores la edad del cuerpo puede considerarse pre-Mesozoica. Kohn *et al.* (1984) presentan una edad de 14,4 m.a. determinada en apatito por el método de huellas de fisión, que representa la edad del levantamiento.

Sinonimia: Granito de la Colonia Tovar de Ostos (1990, p. 55). Granito de El Limón de Beck (1985, 1986, p. 311).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Kohn, B. P., R. Shagam y T. Subieta, 1984. Results and preliminary implications of sixteen fission-track ages from rocks of the western Caribbean Mountains System. *Geol. Soc. Amer. Memoir* 162, p. 415-421.

Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Caribe del Caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Rodríguez, D., 1972. Geología de la región de Choróní - Colonia Tovar y lago de Valencia (Resumen y mapa). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1783-1784.

Wehrmann, M., 1972. Geología del área de Guatire - Colonia Tovar. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 5, 4: 2093-2121.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)