




MIOCENO TARDIO

Estado Táchira-Colombia

Referencia original: James 1977, en Van Houten y James (1984).

Consideraciones históricas: Esta formación fue propuesta originalmente por James (1977 en Van Houten y James, 1984), como parte del Grupo Guayabo, descrito detalladamente por los autores.

Localidad tipo: No se menciona localidad tipo.

Descripción litológica: Lodolitas de color marrón parduzco a moteadas, y delgados horizontes de areniscas que localmente puedan alcanzar grandes espesores, son abundantes hacia la parte superior; una secuencia de areniscas de canal y horizontes locales oolíticos ferríferos. Estas areniscas ferríferas contienen ooides de goethita y bertierina, y algunos lignitos de unos 10 a 15 cm de espesor.

Espesor: Se ha medido un espesor para esta formación de 390 a 610 m.

Extensión geográfica: Alrededores de Cúcuta (Colombia) y parte sureste del lago de Maracaibo.

Contactos: Suprayace a la Formación Cúcuta, e infrayace a la Formación Urimaco. James (1977), en Van Houten (1984), la consideró equivalente hacia el norte, a las formaciones Isnotú y Betijoque.

Fósiles: Se han hallado fósiles en las lodolitas, consistentes en fragmentos de dientes y conchas de tortuga, vértebras y fragmentos de cocodrilo. Moldes de gasterópodos y pelecípodos de poco valor diagnóstico, moldes de *Ophiomorpha* y de *Thalasinoides*.

Paleoambientes: Acuático a parállico.

© N. Pimentel de B. y A. Bellizzia, 1997

Bibliografía y Referencias

Van Houten, F. B. y H. James, 1984. Late Cenozoic Guayabo delta complex in southwestern Maracaibo Basin, northeastern Colombia. The Caribbean South American Plate Boundary and Regional Tectonics. *Geol. Soc. of América*, Mem., 162: 325-332.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)