

CRETACICO (Albiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: V. Campos y S. Osuna, 1977, p.455.

Consideraciones históricas: Campos y Osuna (1977), en su estudio la región de Boca de Uchire, propusieron muchos nombres nuevos para secuencias que afloran en la "faja tectónica piemontina", la "zona de fallas de corrimiento" (Complejo de Chacual), "zona volcada" y "zona de buzamientos suaves". Propusieron el nombre informal "Calizas Albienses" para unos 15 m de calizas grises masivas, de grano grueso a conglomerático, con frecuente gradación vertical y conchas recrystalizadas y, hacia el tope, calizas y areniscas calcáreas grises con conchas y fragmentos de fñanita y cuarzo. Las calizas afloran en la quebrada La Güairita, afluente del río Chavez, estado Anzoátegui. Macsotay (1977, *fide* Campos y Osuna *op. cit.*) identificó los siguientes macrofósiles que asignó al Albiense medio tardío: *Exogyra* cf. *squamata*, *E.* cf. *bussingaulti*, *Pyramidellide* sp., *Lunatia* ? sp., *Turritella* sp. y *Nerinea* ? sp. Interpretaron un ambiente de plataforma cercana a un escarpe o acantilado, con arrastre de los clásticos gruesos por un cañon de poca pendiente. Postularon un contacto superior discordante con la Formación La Güairita (Coniaciense-Campaniense?); la base de la secuencia no aflora.

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., 1: 449-467.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-b. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina de la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, estado Guárico. *Guía de Excursión No. 5, Mem., V Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., Soc. Venezolana Geol., 5: 159-189.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)