

PRECAMBRICO

Estados Bolívar y Amazonas

McCandless (1965) publicó originalmente el término "Serie Ignea de Cuchivero" para designar rocas ígneas ácidas expuestas en la región noroccidental del estado Bolívar, rocas intrusivas ácidas y a la Formación Cinaruco. Posteriormente el mismo autor (1966) empleó el nombre "Conjunto Igneo de Cuchivero" para referirse a la misma unidad. Ni conjunto ni serie se consideran términos estratigráficos válidos aplicables a la unidad propuesta de acuerdo al Código Norteamericano de Nomenclatura Estratigráfica que aquí se segs. Ríos (1972) propuso reemplazar este nombre por el de Asociación Ignea de Cuchivero, un término que tampoco se considera válido, según el mismo Código, ya que de esa manera intentó incluir dos unidades litodémicas (Granito de Guaniamito y Granito de Santa Rosalía) y una litoestratigráfica (Formación Caicara) en una sola superunidad, para lo cual debería usarse el de complejo si así se cree necesario. Actualmente se emplea informalmente el término Grupo Cuchivero para referirse a algunas de las unidades litoestratigráficas anteriormente señaladas.

Véanse [CUCHIVERO, Grupo](#); [CINARUCO, Formación](#); [CAICARA, Formación](#); [GUANIAMITO, Granito de](#); [SANTA ROSALIA, Granito de](#).

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

McCandless, G. L., 1965. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del Estado Bolívar. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 19-28.

McCandless, G. L., 1966. Geología general de la parte septentrional del Escudo de Guayana en Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 140-153.

Ríos, J. H., 1974. Geología de la región Upata-El Palmar-Villa Lola. estado Bolívar, *X Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, Ministerio de Energía y Minas, Pub. Espec. N° 6, p. 354-372.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, 9(19): 356-380.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)