

TERCIARIO (Mioceno Tardío-Plioceno)

Estado Táchira-Colombia

Referencia original: James, 1977 (en Van Houten y James, 1984)

Consideraciones históricas: Esta formación fue propuesta originalmente por James (1977) como parte del Grupo Guayabo, y debido a su litofacies, esencialmente equivalente a las formaciones Isnotú y Betijoque, y descrita en el sureste del lago de Maracaibo y en los alrededores de Cúcuta.

Localidad tipo: No se menciona una localidad tipo.

Descripción litológica: Consiste de una secuencia variable de lodolitas carbonáceas de color marrón parduzco, intercaladas con lentes delgados y bancos de areniscas bandeadas, de grano fino. Hacia la parte superior, se hallan capas de areniscas depositadas a lo largo de la línea de costa en frente deltáico, y algunos depósitos de areniscas de canal.

Espesor: Se han medido espesores de unos 110 a 150 m.

Extensión geográfica: Esta formación aflora en los alrededores de Cúcuta (Colombia), y en la parte sureste de la cuenca de Maracaibo.

Contactos: Suprayace a la Formación León de edad Oligoceno Mioceno temprano, y es concordante con la Formación Cornejo suprayacente. Es equivalente hacia el norte, con las formaciones Isnotú y Betijoque.

Fósiles: Se han hallado fósiles dispersos en las lodolitas y areniscas fangosas, que consisten de fragmentos de dientes y conchas de tortuga, vértebras y fragmentos de cocodrilo, moldes de gasterópodos pobremente preservados, y moldes de *Ophiomorpha*, en las capas de areniscas y *Thalasinoides*.

Edad: Mioceno tardío a Plioceno.

Paleoambiente: Se depositó en un ambiente de frente deltáico, con procesos parálicos a fluviales.

© N. Pimentel de B. y A. Bellizzia, 1997

Referencias

Van Houten, F. B. y H. James, 1984. Late Cenozoic Guayabo delta complex in southwestern Maracaibo Basin, northeastern Colombia. The Caribbean South American Plate Boundary and Regional Tectonics. *Geol. Soc. of América*, Mem., 162: 325-332.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)