

Esta es una nueva formación propuesta por Aguasuelos S.A. El estratotipo compuesto para esta nueva formación se encuentra a lo largo de la pica sureste-noroeste entre El Algarrobito, cerro El Pato, río Santa Ana; el curso medio e inferior del río Santa Ana, hasta el paso o puente sobre el mismo río Cumacatal, sector La Colonia.

Se caracteriza por ser un intervalo detrítico con microconglomerados, areniscas, limolitas que predominan en la parte inferior donde se intercalan con ocasionales capas de carbón, arcillitas y marlitas. Los microconglomerados consisten de clastos polimícticos angulares a subangulares, compuestos de metamorfitas procedentes de la napa metamórfica de Araya-Paria, filitas cuarzo micáceas, filitas y esquistos cloríticos, meta-areniscas, cuarzo de filón y de sedimentitas de las napas de El Zorro y El Pato, limolitas y chert negro, calizas micríticas. Los clastos varían entre 3 milímetros y 3 centímetros, estando embebidos dentro de una matriz arenoso-calcárea y ferruginosa de grano fino, regularmente estratificada, de color gris medio que meteoriza a pardo oscuro. Las areniscas son polimícticas, de grano fino a muy fino, de color gris que meteorizan a pardo oscuro. Las limolitas son de color gris oscuro que meteorizan a pardo oscuro y marrón, siendo calcáreas arenáceas y ferruginosas, son resistentes y presentan ocasionalmente lentes de microconglomerados. Interestratificadas con las areniscas y las limolitas aparecen ocasionales capas delgadas de lignitos marrón oscuro y negros. Las arcillitas son calcáreas y muy micáceas, localmente margosas, de color verdoso que meteorizan a pardo amarillento y crema. Las marlitas y arcillitas contienen a lo largo de sus planos de estratificación abundantes moldes de bivalvos y gasterópodos muy deformados.

Como fósiles se presentan bivalvos, gasterópodos e icnofósiles.

Se sugiere una edad Plioceno Tardío?

El tipo de sedimentación es de agua dulce, con influencia fluvial, la mezcla de fauna de agua salobre indica que en su base era una laguna marina temporalmente conectada a ríos y en la parte superior, posiblemente, lago de aguas dulces de gran extensión.

M. Furrer y M. Castro, 1997

Referencias

Furrer, M. y M. Castro, 1997. *Nuevas unidades propuestas por AGUASUELOS INGENIERIA sobre datos inéditos de LAGOVEN S.A., en la cuenca oriental de Venezuela*, en prensa, 11 p.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)