

NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: C. Wiedenmayer, 1924, p. 510.

Wiedenmayer (1924) denominó "Curamichateserie" a un desarrollo local de areniscas de varios tipos, pero la correlación que hizo con calizas orbitoidales eocenas de Cerro Campana ("Guayavalserie") debe ser descartada. Liddle (1928), bajo el encabezamiento de Lutitas de Agua Clara, mencionó las capas de Curamichate y la presencia de lignitos que correlacionó con los de El Isiro, cerca de Coro. Senn (1935) las denominó "Curamichatesande" y posteriormente (1940) las designó con el nombre compuesto de Solito-Curamichate, nombre que fue declarado inválido. Liddle (1946) incluye las areniscas de Curamichate en la parte superior extrema de la Formación Cerro Pelado y menciona la presencia en ellas de algunos lechos de carbón. Renz (1956, LEV I) consideró las areniscas de Curamichate como un desarrollo local en la parte inferior del Grupo Agua Salada, cerca del contacto entre las formaciones San Lorenzo y Pozón. La localidad tipo de la unidad es el acantilado y alrededores de Curamichate, en la costa entre San Juan de los Cayos y Agüide. El intervalo es una facies restringida a las cercanías de la localidad tipo.

Díaz de Gamero (1985b) describe la unidad como un olistostromo en donde bloques de diversos tipos de areniscas, limolitas y carbón, de diferentes tamaños y formas se encuentran embebidos en una matriz lutítica y es parte del Miembro El Salto de la Formación Agua Salada. Forma un alineamiento casi este-oeste, que puede estudiarse desde la fila de La Tocineta y cerros Togogo, La Ceiba, Cachicamo, Ortiz hasta el acantilado de Curamichate. Aquí los bloques alcanzan gran tamaño y entre ellos existen capas deslizadas y replegadas en forma compleja. Algunos bloques han quedado como "islotos" cercanos a la costa, luego que la erosión eliminara las lutitas en que estaban embebidos. Hay también bloques medianos y pequeños, incluso fragmentos angulares de algunos milímetros.

Díaz de Gamero (1985b) interpreta esta unidad como producto de deslizamientos en respuesta a una falla de crecimiento, que provocó el desplome masivo de sedimentos previamente depositados en una llanura deltaica y ya litificados. La edad la asigna a la parte terminal del Mioceno temprano y la correlaciona con la Formación Cerro Pelado.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, VI Cong. Geol. Venez., Mem., 1: 454-502.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 1-728. (Ed. en inglés)

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 24(9): 1548-1610.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Berry, E. W., 1936. Tertiary fossil plants from Venezuela. II. *U.S. Nat. Mus., Proc.*, 83(2988): 335-360.

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bold, Van Den, W. A., 1964. Nota preliminar sobre los ostracodos del Mioceno al Reciente de Venezuela. "Geos", Univ. Cent. Venez., Caracas, 11: 7-18.

Cushman, J. A., 1929. A late Tertiary fauna of Venezuela and other related regions. *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 5(4): 77-101.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1941. New Oligocene-Miocene Foraminífera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.

Jeannet, A., 1928. Contribution a l'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Vénézuéla, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 48: 1-44.

Leriche, M., 1938. Contribution a l' etude des poissons fossiles des pays riverains de la Mediterranée americaine (Vénézuéla, Trinité, Antilles, Mexique). *Soc. Paléont. Suisse, Mém.*, 61: 1-42.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *Bth. Amer. Sci. Congr, USA.*, 4: 513-571.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.* 32, 219 p.

Renz, H. H., 1959, San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Renz, H. H. y H. H. Suter, 1939, The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 23(8): 1242.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Straelen, V. van, 1933. Sur des crustacés décapodes cenozoïques du Vénézuéla. *Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, Bull.*, 9(10): 14.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer Asoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960, Estratigrafía del Oligoceno y Miocono inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, 1: 407-465.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)