




MESOZOICO ?

Estado Aragua

Referencia original: C. Beck, 1985, p. 178.

Consideraciones históricas: Esta unidad fue cartografiada y descrita por Smith (1952) quien la denominó "Granito sódico". MacLachlan *et al.* (1960) y Shagam (1960) siguen el criterio de Smith y cartografían otros cuerpos adicionales, pero no añaden a su descripción. Beck (1985, 1986) señala que estos cuerpos están constituidos por una tonalita muy alterada y deformada, e introduce el nombre de Gneis Tonalítico de Curiepe, dentro de su ["Napa de Caucagua - El Tinaco"](#).

Localidad tipo: Se ubica en la carretera entre Tejerías y Tiara, a unos 2 km al suroeste del caserío Curiepe, estado Aragua (Beck, 1985, p. 182). Hoja 6746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Beck (1985) describe estas rocas como una serie de filones (¿sills o diques?) de 50 cm a varios metros de espesor y visibles por extensiones de más de 100 m de longitud, concordantes con la foliación de los esquistos micáceos adyacentes y replegados junto a ellos, la roca es un gneis de ojos de grano fino, homogéneo, donde la foliación es resaltada por las micas alteradas. Presenta aproximadamente un 30% de minerales ferromagnesianos alterados (anfíbol alterado, agujas de actinolita y mica cloritizada). La roca no contiene feldespatos sódicos como supuso Smith (1952), pero corresponden únicamente a plagioclasa deformada y alterada. La estructura implica que estas rocas fueron emplazadas anteriormente a la fase metamórfica que generó la foliación principal, por lo tanto ha sido metamorfizada y deformada conjuntamente con la roca caja. La roca puede clasificarse como una tonalita y localmente como diorita cuarcífera.

Espesor: Los cuerpos individuales pueden tener espesores de hasta 50 m.

Extensión geográfica: Esta unidad ha sido cartografiada en el sector de su localidad tipo, e igualmente al noroeste de [Tácata](#) (Beck, 1985, p. 184, 1986), así como un cuerpo mayor a unos 10 km al suroeste de Tejerías, en los alrededores de Zuata.

Contactos: Son concordantes con las rocas adyacentes del Esquisto de Tinapú y originalmente es probable que hayan sido "sills".

Edad: No hay criterios firmes para interpretar su edad, pero Beck (1985, 1986) estima que pudiera ser Triásico - Jurásico o inclusive pre-Mesozoico.

Correlación: No se ha correlacionado con otras unidades.

Ilustraciones: [Mapa Gneis Tonalítico de Curiepe](#) y [Mapa geológico simplificado de la parte occidental del Estado Miranda](#).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 676-684. Versión en inglés: Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.

Shagam, R., 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). Bol. Geol., Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)