


**ORDOVICICO TARDIO** (Caradociense)

Estado Mérida

Referencia original: P. Christ, 1927, p. 404.

Consideraciones históricas: Este nombre fue incluido originalmente por Christ (1927) en su Serie Caparo-Bella Vista, para designar rocas metamórficas expuestas al sur del río Caparo, estado Mérida, que asignó al Paleozoico inferior. Posteriormente, ésta fue dividida por Kundig (1938-a, b) en Grupo Caparo, compuesto de rocas no metamorfizadas, y en Formación Bella Vista. González de Juana (1951) modificó el rango de la unidad a Formación, y suministró la primera descripción adecuada. Leith (1938) identificó fósiles hallados por Terry (en Schuchert, 1935) en la localidad tipo, que establecen una edad ordovícico medio. Pierce *et al.* (1961) mencionaron fósiles adicionales de la misma edad. Compañías Shell y Creole (1964) añadieron a la sección establecida de la Formación Caparo, un espesor considerable (1.670 m) de rocas parcialmente conglomeráticas del Silúrico temprano y medio, expuestas en las quebradas Cordero, Lira y el Horno, que habían sido incluidas por autores anteriores, en la Formación Mucuchachí y por Pierce (1956), en sus formaciones Remolino y Libertad (en parte). Arnold (1966) mantiene el nombre en esa acepción, pero sugiere una posible discordancia intraformacional. Shagam (1968) se refiere a la unidad en el mismo sentido, y con la extensión estratigráfica empleados por Compañía Shell y Creole (*op. cit.*), con el nombre de Sección del Paleozoico Inferior: Siluro-Ordovícico, aunque destaca el hiatus paleontológico, y las diferencias litológicas entre las rocas del Ordovícico Medio y las del Silúrico temprano y medio. Según Martín Bellizzia (1968), la sección silúrica ha sido separada posteriormente con el nombre de Formación El Horno, en informe inédito, por cuya razón la Formación Caparo, designa únicamente las rocas descritas originalmente con este nombre por González de Juana (1951-a). Fierro (1973) hace referencia a una secuencia representada por conglomerados, areniscas, limolitas, lutitas graptolíticas interestratificadas, con abundante fauna del Ordovícico medio al Silúrico, que incluye dentro del Grupo Caparo. Benedetto y Sánchez (1979) mencionan a la Formación Caparo, como la única formación ordovícica, a la cual asignan una edad Caradociense inferior, con abundante fauna de braquiópodos, trilobites y graptolites. Marechal (1983) se refiere a una Formación Caparo, *sensu stricto*, constituida por una alternancia de lutitas y areniscas de grano fino a grueso, de color gris, con graptolites, trilobites y braquiópodos de edad Caradociense.

Localidad tipo: Río Caparo, en el camino Mucuchachí-Santa Bárbara de Barinas, unos 17 km al oeste de Santa Bárbara, estado Mérida. Hoja 5939, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Principalmente limolitas arenáceas gris oscuro, limolitas finamente micáceas, localmente carbonáceas, frecuentemente laminadas, areniscas de grano fino a medio, color gris, a veces calcáreas y fosilíferas y lutitas que incluyen algunos tipos oscuros y carbonáceos con graptolites. Según Benedetto y Sánchez (*op. cit.*), en el techo de la unidad se presenta un conglomerado polimíctico, que contiene clastos de rocas metamórficas tipo Bella Vista.

Espesor: A base de secciones incompletas, se estima un espesor mínimo de 200 m. El espesor de 2.000 m señalado por Compañías Shell y Creole (*op. cit.*), incluye la sección de la Formación El Horno; para la sección ordovícica en la quebrada Cordero, mencionan 280 m de espesor.

Extensión geográfica: La unidad aflora por 45 km de distancia, a lo largo del valle del río Caparo y sus tributarios principales. Se prolonga hacia el sur, en los llanos de Barinas, donde se han localizado trilobites caradocianos, en núcleos de perforaciones (Benedetto y Sánchez, *op. cit.*).

Expresión topográfica: No manifiesta expresión topográfica definida.

Contactos: La Formación Caparo suprayace discordantemente a la Formación Bella Vista. El contacto superior con la Formación El Horno, es de probable discordancia, indicada por el hiatus paleontológico y la presencia frecuente de conglomerados en esta unidad.

Fósiles: Los diferentes autores, mencionan la existencia de abundantes restos fósiles de braquiopodos, trilobites y graptolites. Benedetto y Sánchez (1979) citan entre las formas identificadas, los siguientes: *Dicranograptus nicholsoni* Hopkinson, *Dicranograptus caparoensis* Leith, *Climacograptus peltifer* Lapworth, *Orthograptus* sp,

Glyptograptus cf. *G teretiusculus* (Hisinger), *Amphigraptus* cf. *A divergens* (Hall), *Nemagratus gracilis* Hall, *Dalmanella* sp., *Glyptortis* sp, *Onniella* sp, *Platystrophia* cf. *P. extensa* mc evan, *ptychpleurella* sp., *Bicuspina* sp, *Onnia terryi* (Leith) *Triathrus* sp, *Flexicalimene* sp, y ? *Parabasiliscus*.

Edad: Las faunas determinadas para la Formación Caparo, indican una edad Caradociense inferior (Ordovícico tardío).

Correlación: Diferentes autores (Schubert 1968; Shagam, 1970; Grauch, 1971 y Campos 1977) admiten la posible correlación entre la Formación Caparo, y parte de la Formación Cerro Azul.

Paleoambientes: Esta unidad se depositó en una zona de plataforma, con alternancia de facies litorales y de mar abierto.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Grupo, Serie Caparo, Grupo, Serie Caparo-Bella Vista.

© **Oscar Odreman y Armando Useche C., 1997**

Referencias

Arnold, N. C., 1966. Upper paleozoic Sabaneta-Palmarito sequence of Mérida andes, *Bull*, 50(11): 2366-2387.

Benedetto, G. y T. Sánchez, 1979. Modelo de desarrollo del Océano Proto-Atlántico en la región Norte de Suramérica. Fourth latinamerican Geological conference, Port-of-spain, Trinidad And Tobago.

Campos, V., 1977. Estratigrafía de la secuencia premesozoica de la región de Calderas Mem II. Cong Lat-Geol; 3: 1705-1721 Caracas Nov. 1973.

Christ, P., 1927. La Coupe Geologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les andes Venezueliennes, *Eclog. Helv*, 20(3): 397-414.

Compañía Shell de Venezuela y Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic Rocks of Mérida andes Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull*, 48(1): 70-84.

Fierro, I., 1973. Geología de la región de Caparo, Resumen Mem. II *Cong. Lat. Geol*, Caracas, 3: 1765-1767.

González de Juana, C., 1951-a. Introducción al Estudio de la Geología en Venezuela. Capítulo 1: Geología de los andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo 2: las Formaciones Paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol*. Caracas, (1): 117-139.

Grauch, R. I., 1971. Geology of the Sierra Nevada South of Mucuchachí, venezuelan andes ph. D. Thesis, Univ. Pennsylvania.

Kündig, E., 1938-a. Las rocas precretáceas de los andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol; y Min*. Caracas, (2-4): 21-43.

Kündig, E., 1938-b. The pre-Cretaceous rocks of the central Venezuelan Andes with some remarks about the tectonics. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43

Leith, E., 1938. A Middle Ordovician fauna from the venezuelan andes. *Amer. Jour. Sci.* 5 th, ser, 36(215): 337-344.

Marechal, P., 1983. Les Temoins de Chaîne Hercynienne dans le Noyau Anciennes Andes de Mérida (Venezuela): These de Doctorat de 3eme cycle. Brest, 1983.

Martin Bellizzia, C., 1968. Edades Isotópicas de rocas venezolanas, *Bol. Geol;* Caracas, 9(19): 356-380.

Pierce, G. R., 1956. Devonian sediment of Mérida andes of Southwestern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 40(9): 2278-2283.

Pierce, G. R., C. C. Jefferson Jr. y W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic localities in Mérida andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 45(3): 342-375.

Schubert, C., 1968. Geología de la Región de Barinitas Santo Domingo, andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, 9 (19): 182-261.

Schuchert, C., 1935. Hitorial geology of the Antillean-Caribbean region, John Wiley & Son, inc., New York (Letter of R. A. Terry to Ch. Schuchert)

Shagam, R., 1968. Commentary on the Caparo area. *Asoc. Venez. Geol. Bol. Inf*, 11(6): 171-181.

Shagam, R., 1970. Informe Geológico de la región central de los andes. *Inf. Int. Min. Minas e Hidrocarburos*. Caracas.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York. 890 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)