


**JURASICO - CRETACICO**

Distrito Federal

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p.12.**Consideraciones históricas:** Aguerrevere y Zuloaga (1937) introduce el nombre de "Serie Caracas", que posteriormente (1938) modificaron a Grupo, para designar a la secuencia de rocas

metasedimentarias de grado bajo, bien expuestas en la región de Caracas, que habían sido mencionadas informalmente o descritas someramente por muchos autores anteriores (una buena recopilación bibliográfica de los trabajos previos al de Aguerrevere y Zuloaga, 1937, puede verse en la primera edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela). Dengo (1951) en su estudio de la región de Caracas describe las rocas de este Grupo y señala estar constituido por las formaciones Las Brisas, Antimano, Las Mercedes y Tacagua. Smith (1952) lo estudia en la región de Los Teques - Cúa. Seiders (1965) añade a la Formación Chuspita como la unidad más joven del Grupo. Su cartografía geológica ha sido extendida, entre otros, en los trabajos de [Wehrmann \(1972\)](#), Asuaje (1972), Urbani y Quesada (1972) hacia el este de Caracas, Bellizzia y Rodríguez (1968) en el estado Yaracuy, González (1972) recopila los trabajos cartográficos de las tesis doctorales de la Universidad de Princeton en la parte centro - occidental de la Cordillera de la Costa. Urbani *et al.* (1989-a, b) recopila los trabajos de las regiones de El Palito - Valencia - Maracay, y [Oritapo - Cabo Codera](#) - Capaya. Las "formaciones" Tacagua y Antimano previamente incluidas en este Grupo, son redefinidas como fases por Navarro *et al.* (1988) incluyéndolas en su Complejo la Costa. Parte de las rocas previamente consideradas como Formación Las Brisas aflorantes al norte del macizo de El Avila hoy se incluyen en el Esquisto de San Julián del Complejo Avila. Con estos cambios sugeridos, el Grupo hoy día queda constituido por las formaciones Las Brisas, Las Mercedes y Chuspita, ocupando la franja septentrional de la serranía costera de la Cordillera de la Costa, inmediatamente al sur de las franjas que ocupan los complejos la Costa y Avila.

Localidad tipo: No se ha establecido formalmente pero en forma general corresponde a la zona de Caracas, en cuyos alrededores están las localidades típicas de sus formaciones mayoritarias: Las Brisas y Las Mercedes. Hoja 6847, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La litología típica de la Formación Las Brisas es el esquisto (o filita) cuarzo - muscovítico - feldespático (clorítico, así como metaarenisca y metaconglomerado también cuarzo - feldespático - micáceo. En la Formación Las Mercedes predomina el esquisto cuarzo - calcáreo - muscovítico - grafitoso, de color gris oscuro, e igualmente en la Formación Chuspita, si bien en ella hay mayor abundancia de metaarenisca. Para mayores detalles véase las citadas formaciones.

Extensión geográfica: El Grupo aflora típicamente en la región de Caracas - Los Teques y sus alrededores, y se ha cartografiado como una franja casi continua en sentido este - oeste que se extiende desde el estado Yaracuy, hasta la zona de Barlovento en el estado Miranda. Sus unidades constituyen una franja predominante de la Cordillera de La Costa.

Contactos: Los contactos entre las rocas de este Grupo con el Complejo Avila hacia el norte son tectónicos (Urbani y Ostos, 1989), con las rocas de la faja Caucagua - El Tinaco al sur igualmente son tectónicos (Beck, 1986). Los contactos entre las formaciones Las Brisas y Las Mercedes son tectónicos (Urbani *et al.*, 1989), mientras que entre las Formación Las Mercedes y Chuspita parece ser concordante y transicional (Seiders, 1965).

Fósiles: Hasta la fecha los hallazgos de fósiles identificables corresponden a la Formación Las Brisas y son los siguientes: Wolcott (1943) determina varias especies de moluscos provenientes de la quebrada Care, cerca de Guarenas, cuya edad se determinó como posiblemente Jurásico - Cretácico, mientras que Urbani (1969, 1973) localiza fósiles bien preservados en la Cueva del Indio, La Guairita, al sureste de Caracas, de edad Jurásico tardío.

Edad: Las determinaciones paleontológicas de los hallazgos de Wolcott (1943) y Urbani (1969, 1973) permiten asignarle a la Formación Las Brisas una edad Jurásico Tardío - Cretácico, mientras que las formaciones Las Mercedes y Chuspita generalmente se han considerado como de edad Cretácico, por lo tanto el Grupo en su totalidad puede considerarse como Jurásico - Cretácico.

Correlación: Parte de este Grupo se ha correlacionado con rocas metamórficas de la península de Araya - Paria y de la cordillera norte de Trinidad. Por otra parte, igualmente se ha correlacionado con parte de la secuencia no metamorfozada de Venezuela oriental, así, la Formación Las Mercedes se ha considerado como el equivalente metamórfico del Grupo Guayuta (Aguerrevere y Zuloaga, 1938; Navarro *et al.*, 1988). También se ha correlacionado con el Grupo Los Cristales que aflora en los estados Lara y Yaracuy.

Véase [AVILA, Complejo](#); [COSTA, Complejo](#); [LAS BRISAS, Formación](#); [LAS MERCEDES, Formación](#) y [CHUSPITA, Formación](#).

© *F. Urbani P., 1997*

Referencias

- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.
- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.
- Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.
- Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formation of the central part of the Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260 (ed. en inglés).
- Asuaje, L., 1972. Geología de la región de Guatire - cabo Codera (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1289.
- Beck, C., 1986. Geologie de la chaine Caraïbe su merdien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-563.
- Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-116.
- González Silva, L., 1972. Geología de la Cordillera de la Costa, zona centro - occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.
- Navarro, E.; M. Ostos y F. Yoris, 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico Medio - Paleogeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.
- Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12):289-416.
- Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.
- Urbani, F., 1969. Primera localidad fosilífera del Miembro Zenda de la Formación Las Brisas: Cueva del Indio, La Guairita, estado Miranda. *Bol. Inf., Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 12(11): 417-423.
- Urbani, F., 1973. Notas sobre el hallazgo de fósiles en rocas metamórficas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Inf., Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 16(4-6): 41-54.
- Urbani, F.; O. Contreras y F. Barrios, 1989-a. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. *Mem. VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.
- Urbani, F.; R. Sánchez y J. Silva, 1989-b. Reconocimiento geológico del área de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, Distrito Federal y Miranda. *Mem. VII Congr. Geol. Venez.*, Barquisimeto, 1: 223-243.
- Urbani, F. y M. Ostos, 1989. El Complejo Avila, Cordillera de La Costa, Venezuela. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 205-217.

Urbani, F. y A. Quesada, 1972. Migmatitas y rocas asociadas del área de La Sabana. Cordillera de la Costa. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 5, 4: 2375-2400.

Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire - Colonia Tovar. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 4: 2093-2121.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of the Coast Range of Venezuela. *Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol.*, 27: 1632.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bermúdez, P. J. y D. Rodríguez G., 1962. Notas sobre la presencia de tintínedos o calpionelas en Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Geol., 5(2): 51-57.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Cortese, E., 1901. Excursioni geologiche al Venezuela. *Soc. Geol. Italiana*, Roma, Bull., 20: 447-469. Resumen (1904) en: *Inst. Min. Engin.*, trans., 25: 783-784. Traducido al castellano por Alvarado, L., 1924 en: *Rev. Col. Ing. Venez.*, (18): 83-91.

Dusenbury, Jr., A. N., 1960. The stratigraphy of the Cretaceous Temblador Group of the eastern Venezuela basin. *Asoc. Venez. geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(9): 246-257.

Dusenbury, A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. (Venezuela), 1: 17-26.

Hedberg, H. D., 1931. Mesozoic stratigraphy of northern South America. *8th. Amer. Sci. Cong.*, U.S.A., 1940, Proc., 4: 195-227.

Humboldt, A. Von, 1816-1832. *Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente*. Traducción en 5 tomos por L. Alvarado, E. Rohl y J. Nucete-Sardi, Biblioteca Venezolana de Cultura, Min. Educ. Nac., Caracas. Título original: "Voyages aux regions equinoxiales du Nouveau Continent, fait en. 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, par A1. de Humboldt et. A. Bompland, redige par Alexandre de Humboldt, avec un Atlas géographique et physiquer, en 13 volúmenes, que representan la segunda edición. Véase Tomo I, P. VII a IX para más detalles (3a Ed.: Monte Avila Edrs., 1985, 5 tomos).

Hutchinson, A. G., 1939. A note upon the Jurassic in Trinidad, B. W. I.; p. 1243; en: Trinidad geological conference, April 18-27, 1939. Resúmenes: por H. D. Hedberg, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 23(8): 1238-1244.

Karsten, H., 1851. Ueber die geognostischen Verhältnisse des nördlichen Venezuela. *Archiv. für Min. Geogn. Bergn. Hutten*, 24(2): 440-479.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the southwestern and northeastern parts of Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 47-70 (ed. en inglés).

Konigsmark, T. A. 1965. Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Lamare, P., 1927. Contribution a L'etude des roches de la Cordillere Caraïbe (Venezuela). *Soc. Geol. France*, Bull., 4me. sér., 27(1-2): 127-162.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

MacLachlan, J. C., R Shagam y H. H. Hess, 1960. Geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 676-684. Versión en inglés: Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.

Maxwell, J. G. and G. Dengo, 1950. Geología del área de Carúpano, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2(1): 149-162.

Oxburgh, E. R. 1965. Geología de la región del estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Rutten, L., 1931. On rocks from the Caribbean coast range (northern Venezuela), between Puerto Cabello-La Cumbre and between La Guaira-Caracas. *Konin. Akad. Weten. Amsterdam, Proc.*, 34(7): 828-841.

Schuchert, C., 1935. *Historical geology of the Antillean-Caribbean region*, John Wiley & Son, inc., New York (Letter of R. A. Terry to Ch. Schuchert)

Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. N° 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der Karibische Gebirge. *Geogr. Abhandl.* (Penck), 3(1): 238.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol.* (Venezuela), 2(6): 333-406.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and of Trinidad. *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)