




TERCIARIO (Paleoceno-Eoceno Temprano)

Estado Guárico

Referencia original: A. L. Peirson III, A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966, p. 203.

Consideraciones históricas: Peirson *et al.* (1966) introdujeron este término para referirse a las capas periarrecifales que asignaron a la

Formación Guárico, y cuya sección tipo se localiza a lo largo del río Caramacate por una distancia de unos 3 km hacia el norte, medidos en línea recta, desde la carretera San Juan de Los Morros-San Sebastián hasta el afloramiento extremo meridional de la Formación Tiara. El nombre aparece en el *Léxico Estratigráfico* (1970) como "Caramate".

Las facies que estos autores reconocieron son: 1) Periarrecifal, compuesta por arenisneas calcáreas, calizas arenosas fosilíferas, capas conchíferas, y conglomerados y brechas con abundantes detritos arrecifales; 2) plataforma de bahía, con limotitas calcáreas muy silíceas en capas delgadas y lodolitas limolíticas, que gradan a lutitas limolíticas astillosas, con foraminíferos y ocasionales láminas y capitas de arenisca con granos finos de roca ígneas. Meteorizan a colores que varían de marrón claro y oscuro, gris oliva y verde pálido.

El espesor asignado a las facies periarrecifal, es de unos 400-500 m y de la facies plataformal, hasta 1000 m. Suprayace en forma discordante a la Formación Escorzonera; también suprayace discordantemente a las volcánicas del Grupo Villa de Cura, y a la Formación Tiara. Su edad fue determinada en base a la presencia de macroforaminíferos (nummulites encordelados y discociclínidos) (Caudri, 1944; De Cizancourt, 1951; Peirson *et al.*, *op. cit.*), foraminíferos planctónicos como *Globorotalia pusilla*, *G. velascoensis* y *G. rex*, y moluscos del grupo *Turritella mortoni*.

La edad asignada es Paleoceno - Eoceno Temprano, y se correlaciona lateralmente con las calizas arrecifales del Miembro Morro del Faro y la Facies Flysch, ambas unidades pertenecientes a la Formación Guárico (CVET, 1970). Gonzalez de Juana *et al.* (1980), definen al Miembro Caramacate, como una variación lateral de la composición del Miembro Los Cajones hacia "...una compleja intercalación de masas alóctonas de caliza, olitostromos y flysch".

Véase [GUARICO, Formación](#).

© *Franklin G. Yoris V., 1997*

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Caudri, C. M. B., 1944. The larger foraminifera from San Juan de Los Morros, State of Guárico, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 28(114): 355-404.

Cizancourt, M. de, 1951. Grands foraminifères du Paléogène, de l' Eocène inférieur et de l' Eocene moyen du Vénézuéla. *Soc. France Mem.* 64, 30(1-2): 1-68.

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, *Bol. Geol.* (Venezuela), Publ. Esp. 4: 1-756.

Peirson, A. L., Salvador, A. y Stainforth, R. M., 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról.*, Bol. Inform., 9(7): 183-224.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)