




PALEOZOICO (Carbonífero Temprano a Pérmico Tardío)

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín Bellizzia, 1961, p. 1480.

Consideraciones históricas: Esta denominación fue utilizada por Martín Bellizzia (1961) en esa forma, para designar la masa granítica zonada que aflora en el área oriental del Macizo de El Baúl. Las

primeras menciones informales del batolito granítico, se deben a Liddle (1946) (granito feldespático rosado intrusionado por pórfido de augita o andesita) y a Bucher (1952) (granito biotítico rosado, localmente porfídico y cortado por rocas volcánicas). Feo-Codecido (1954), realizó el primer estudio petrológico serio del mismo, y distinguió los tres tipos (facies) de granito: un tipo porfídico (Granito de Mogote), un tipo biotítico equigranular (Granito de Mata Oscura-Corralito) y un tipo alcalino (Granito de Piñero), además de diferenciaciones dioríticas y sieníticas. Posteriormente, Martín Bellizzia (*op. cit.*) efectúa el estudio de campo, petrográfico y geoquímico más completo y detallado de los aspectos de facies, emplazamiento, contactos, asimilación, segregación magmática, radioactividad y correlación. Al mismo tiempo, Feo-Codecido (1961), presenta sus observaciones sobre la radioactividad de los granitos en la región de El Baúl. Finalmente, este último autor (1963, 1984), publica las edades radimétricas del granito, conocidas hasta esas fechas.

Localidad tipo: En vista de la gran variedad de tipos y facies de granito presente, no se menciona una localidad tipo única, sino los cerros en que afloran y que son: Mata Oscura, Yagrumal, Cascabel, Los Oripopos, Merecure, Cordero, Puerto Escondido y El Guaical, en el estado Cojedes.

Descripción litológica: En Granito Alcalino Zonado de El Baúl, se distinguen las tres facies texturales, Mogote, Mata Oscura y Piñero. Asociados al granito, se describe una facies sienítica marginal, y las intrusivas hipabisales aplíticas, lamprofídicas y micrograníticas. La facies Mogote constituye la masa exterior del batolito, es de color rosado grisáceo y la textura es porfídica a pegmatítica, de tipo rapakivi (fenocristales de feldespato hasta 12 cm). Esta facies grada hacia el medio del batolito al tipo Mata Oscura, que es de grano equigranular grueso (el granito normal de Feo-Codecido, 1954), de color moteado salmón y gris verdoso, y representa la facies dominante de la región. La facies Piñero ocupa el núcleo del batolito, se considera ser la masa más joven del mismo, y su volumen es el menor de las tres variedades mencionadas; es de grano equigranular, fino a medio y de color rosado salmón, moteado de oscuro. La sienita alcalina, representa una facies subsilícica marginal del batolito, del que constituye apenas el 5%; es de grano medio a grueso hasta pegmatítico, con textura intersertal a traquitoide y presenta estructuras primarias de flujo, bien desarrolladas. Los persistentes diques de aplita alaskítica son de color blanco, y presentan espesores de hasta 17 m. Los diques de lamprófinos, que son de poco espesor y de moderada extensión, pertenecen a las variedades minete, minete sódica y comptonita. Los microgranitos y granofiros se presentan como diques o apófisis, son de color claro, densos y con textura porfídica y matriz afanítica. Martín Bellizzia (*op. cit.*) menciona también la presencia de un granito alterado, a través de toda la región, que se encuentra asociado a la aureola de metamorfismo de contacto, de las capas metapelíticas rojas del Grupo El Barbasco; la roca es densa, de color gris verdoso, y presenta una intensa caolinitización. El Granito de El Baúl, fue invadido por diques de riolita porfídica del Grupo Volcánico de Guacamayas, que no guardan relación genética con el granito.

Ambiente tectónico y petrogénesis: De acuerdo a Martín Bellizzia (*op. cit.*), el Granito Alcalino de El Baúl es del tipo de emplazamiento lento, no orogénico (post-cinemático) y de poca profundidad, lo cual permitió la segregación en la cámara magmática. Fue emplazado en las rocas metasedimentarias plegadas y falladas del Grupo El Barbasco, desarrollando sólo una delgada aureola de contacto, que localmente guarda cierto paralelismo con las rocas intrusionadas. También se observa un paralelismo del granito con la dirección de las fallas mayores.

Extensión geográfica: La masa granítica ocupa la porción oriental y septentrional del Macizo de El Baúl (estado Cojedes), y representa el 20% de la totalidad de las rocas del macizo. Se extiende desde el cerro Barraguán en el este, hasta los cerros Bartolo al este del río Pao (unos 30 km), y desde las colinas de El Mercado al noroeste, hasta el Hato Piñero en el sur (unos 20 km).

Edad: La edad absoluta del Granito Alcalino de El Baúl ha sido determinada en 287 ± 10 m.a. por el método Rb/Sr, y en 270 ± 10 m.a. por el método K/Ar (Feo-Codecido, 1963 y 1984). Estas edades se extienden desde el Pensilvaniano al Pérmico temprano.

Correlación: Martín Bellizzia (*op. cit.*) ha correlacionado el Granito Alcalino de El Baúl, con los granitos de El Palmar y Totumo (sierra de Perijá), La Paz (subsuelo Zulía septentrional), isla de Toas y Bailadores (Andes de Mérida), y con el Granito de La Macarena en Colombia.

Importancia económica: Martín Bellizzia (*op. cit.*) propone el uso de los granitos, especialmente las facies Mogote y Mata Oscura, como material de construcción por su dureza, y como piedra ornamental, por su policromía y sus caprichosas estructuras.

Sinonimia: El nombre del pueblo de El Baúl había sido empleado por Leuzinger (en Feo-Codecido, 1954), para designar indistintamente las Rocas del Basamento, las Igneas Acidas, las Rocas Metamórficas y las Rocas Volcánicas. Esta múltiple homonimia, aparecida en el L.E.V., 1956, ya había sido eliminada en el L.E.V., 1970, pero en esta última edición, se publicó la unidad litodémica de la Sienita Alcalina de El Baúl, como sinónimo innecesario del Granito Alcalino de El Baúl, por ser el primero, sólo una facies marginal del último.

© **Peter Moticska N., 1997**

Referencias

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Feo-Codecido, G., 1954. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Caracas, 3(8): 109-121.

Feo-Codecido, G., 1961. Observaciones radiométricas preliminares en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1681-1697.

Feo-Codecido, G., 1963. ???

Feo-Codecido, G., 1984. ???

Liddle, R. A., 1946. The geology of Venezuela and Trinidad. 2da. ed., *Paleont. Res. Inst.*, Ithaca, N. Y., 890 p.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1453-1530.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas, *Bol. Geol.*, (19): 356-380.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)