


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: B. Korol, 1965, p. 8.

Consideraciones históricas: Korol (1965) designó con este nombre las lavas que representan la fase volcánica básica de la Serie Pastora (hoy Supergrupo). Kalliokoski (1965-a; 1965-b), opinó que los análisis químicos de lavas de El Callao, publicadas por Duparc (1922), indican que son de composición andesítica a basáltica. Menéndez (1968) redefinió la unidad y la integró, junto con la Formación Cicapra, al Grupo Carichapo en la región de Guasipati. Mas tarde, Menéndez (1994) reconoció, en la misma región, la presencia persistente y característica de toleitas magnesianas a comatiitas en la parte inferior de la unidad, identificando este sector como una nueva formación que denominó Florinda. De esta manera, la Formación El Callao quedó restringida a la parte media a superior del Grupo Carichapo suprayaciendo a Florinda. Al redefinirla por segunda vez, Menéndez (*op. cit.*) no propuso ningún cambio en la ubicación de la sección tipo original de la unidad.

Localidad tipo: Río Yuruari desde la desembocadura de la quebrada Iguana hasta 1,5 kilómetros aguas arriba, municipio autónomo El Callao del estado Bolívar; hoja de Cartografía Nacional N° 7838, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La unidad consiste casi en su totalidad de metalavas de composición basáltica (Menéndez, 1972); comúnmente exhiben estructuras en almohadillas hasta de 2 m de diámetro, que presentan amígdalas principalmente de cuarzo que se concentran en el tope de los flujos, además de fracturas radiales rellenas de epidoto y cuarzo; algunas coladas presentan estructura columnar. Las lavas almohadilladas son afáníticas y alternan con coladas no almohadilladas, de grano mas grueso y textura subofítica. Brechas de flujo de hasta 40 cm de espesor alternan con las coladas de lava. En la parte superior contiene jaspe y metaftanitas ferruginosas y manganesíferas. La unidad ha sido afectada por metamorfismo regional de bajo grado, facies del esquisto verde, que localmente, en las zonas de contacto con masas graníticas, pasa a facies de la anfíbolita. Las lavas y rocas básicas intrusivas asociadas cambian gradualmente a color mas oscuro al aproximarse a las masas graníticas del Complejo de Supamo, cambio que es paralelo a un cambio en la mineralogía metamórfica y en la textura. Korol (1965) describió originalmente la unidad como constituida de lavas espilíticas. Menéndez (1994) ilustró la tendencia de cristalización magmática de las rocas volcánicas de las unidades del Grupo Carichapo, donde indicó que las lavas de El Callao son esencialmente toleitas normales con tendencia a toleitas ferruginosas.

Espesor: En los alrededores de El Callao el espesor máximo se estima en 1200 m.

Extensión geográfica: La formación aflora en escala kilométrica en el estado Bolívar, al oeste y sudeste de la Pastora en una franja de hasta 3 kilómetros de ancho, al sur y sudeste de el Callao; al noreste y noroeste de la región de Guasipati; al noroeste de El Dorado en la Región Yuruán-Ave Chica (Benaím, 1982).

Expresión topográfica: Desarrollan serranías de cresta irregulares y meteorizan a suelos rojizos con vegetación boscosa (Menéndez, 1972).

Contactos: Según Korol (1965), la unidad suprayace en contacto concordante a la Formación Yuruari e infrayace a la Formación Caballape; las tres unidades integran su grupo Pastora. Menéndez (1968), señala que el contacto inferior de la unidad es siempre concordante con las rocas graníticas del Complejo de Supamo, que la intrusionan. Según la redefinición propuesta por Menéndz (1994), la unidad suprayace a la Formación Florinda, ubicada en la base del Grupo Carichapo. El contacto superior es transicional con la Formación Cicapra, y donde ésta está ausente, es concordante con la Formación Yuruari.

Edad: Menéndez (1968) señaló la edad de aproximadamente 2000 m.a. del Complejo de Supamo, intrusivo en la formación. Klar (1978, en Menéndez, 1994) determinó edades U-Pb en circones del Complejo de Supamo, dentro de un intervalo de 2050 a 2200 m.a.

Correlación: Espejo (1974) considera que la Formación La Cuaima es comparable mineralógica y químicamente con la Formación el Callao, aunque bien puede ocupar un nivel estratigráfico diferente.

Importancia económica: Constituye la roca caja de vetas auríferas de las minas de El Callao. Estos yacimientos están ubicados en zonas de deformación y de cizallamiento de orientación definida y asociados con sulfuro diseminados (Menéndez, 1972; 1994).

Ambiente tectónico y petrogénesis: Según lo sugiere Menéndez (1994) las lavas de El Callao pueden haber sido producto de volcanismo fisural en corteza oceánica con un patrón primario de norte sur a N 10° E, dentro de una primera fase volcánico sedimentaria que dio origen a los cinturones de rocas verdes que se encuentran en la provincia geológica de Pastora.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Benaím, N., 1982. ???

Duparc, L., 1922. Les roches vertes et les filons de quartz aurifère du Callao au Vénézuéla. *Schweiz. Min. Pet. Mitt.*, Bd. II, p. 1-68.

Espejo, A., 1972. Técnica para la elaboración de mapas isopléticos, aplicación a un modelo geológico. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2201-2211.

Kalliokoski, J., 1965-a. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela, *Bol. Geol.* Caracas, 7(13): 29-104.

Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.

Korol, B., 1965. Estratigrafía de la Serie Pastora en la región Guasipati-El Dorado. (Presentado Cong. Cent. Col. Ing. Venez., 1961). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 3-17.

Menéndez, V. de V., A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estudio de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338.

Menéndez V. de V., A., 1972. Aspectos tectónicos de la evolución geológica del Escudo de Guayana (Resumen). *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1969, MEM., I: 240-243.

Menéndez V. de V., A., 1972. Geología de la región de Guasipati, Guayana venezolana, *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1969, MEM., IV: 2001-2246.

Menéndez, V. de V., A., 1994. Cinturones de Rocas Verdes del Escudo de Guayana en Venezuela; Revisión Estratigráfica; *III Simposio Internacional del Oro en Venezuela*; Libro de Memorias, Asociación Venezolana del Oro, p. 123-139.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)