

CRETACICO TEMPRANO

Estado Sucre

Referencia original: Guillaume *et al.*, (1972)

Consideraciones históricas: El término Miembro El Cazón fue propuesto para una secuencia de la Formación Taguarumo, aflorante en la serranía de Guariquén. Consiste en una secuencia de lutitas calcáreas negras, finamente micáceas y dolomitas calcáreas con concreciones arcillosas, intercaladas a calizas silíceas gris oscuro, en capas delgadas, de 120 m de espesor expuesto. Estas lutitas se hallan por debajo de la secuencia de intercalaciones de calizas con *Choffatella* y lodolitas calcáreas oscuras, atribuidas por Guillaume *et al.*, (*op. cit.*) a la Formación Taguarumo *sensu stricto*. La litología descrita se presenta en forma individual, como intercalaciones delgadas en la Formación Taguarumo, hasta Cumanacoa, al oeste; sin embargo, sólo en el área de Guariquén forma una unidad separable. El contacto inferior no aflora.

Rosales (1976), propone rechazar este miembro por no ser unidad litogenética ni cartografiable, lo cual no corresponde a la realidad, ya que Guillaume *et al.* (*op. cit.*), presentaron un mapa geológico con afloramientos, y la unidad es claramente distintiva de la Formación Taguarumo, del que forma el miembro inferior.

Véase [BARRANQUIN, Formación](#); [TAGUARUMO, Formación](#).

© Oliver Macsotay, 1997

Referencias

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 5(3): 1619-1655.

Rosales, H., 1976. Excursión N° 5: Venezuela nororiental-Serranía del Interior. I parte: Maturín - Muelle de Cariaco. *2 Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas. 2: 467-493.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)