




TERCIARIO (Eoceno superior ?)

Estado Cojedes

Referencia original: D. B. Mackenzie, 1960-a, p. 817.

Consideraciones históricas: Mackenzie (1960-a) introdujo este nombre para designar una peridotita serpentinizada expuesta al norte del caserío Las Lajitas, Estado Cojedes. Menéndez (1965), a base de evidencias de campo, de la ausencia de aureole metamórfica en la roca caja y de su ubicación a lo largo de una falla de corrimiento, postuló que la serpentinita de El Chupón se emplazó tectónicamente en su posición actual en forma de mesa sólida.

Localidad tipo: Dos kilómetros al suroeste de El Chupón, al sureste de Tinaquillo, Estado Cojedes.

Descripción litológica: La roca es una harzburgita serpentinizada de color negro verdoso, compuesta de crisotilo (90%) y bastita (10%) con algo de clinopiroxeno que aparece como mineral vestigial.

Espesor: Máximo de 200 metros.

Extensión geográfica: La unidad tiene una extensión de dos kilómetros y medio en sentido este-oeste al norte de Las Lajitas, Estado Cojedes.

Contactos: La serpentinita se emplaza a lo largo de la falla de El Tinaco; está truncada por la falla de Carrizal hacia el oeste y se acuña hacia el este (Menéndez, 1965).

Edad: Eoceno superior (?), por sus relaciones con fallas de esa edad.

Correlación: La unidad se correlaciona con la peridotita de Tinaquillo por el contenido en ambas de enstatita con lamelas de exsolución diopsídica, que sólo se observan en estas dos peridotitas de la Cordillera de la Costa.

Referencias

Mackenzie, D. B., 1960-a. La peridotita de Tinaquillo. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 761-826.

Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)