

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Trujillo

Referencia original: M. de Cizancourt, 1951, p. 37.

Consideraciones históricas: Cizancourt (1951) introdujo el término, para designar una de las capas características de caliza distinguidas y descritas en la Formación Valle Hondo, con faunas del Eoceno medio reconocidas por ella, y que incluyen *Operculinoides jennyi*, *Lepidocyclina (Pliolepidina) cedarkeysensis* y *L. (P.) peruviana*.

Véase [VALLE HONDO, Formación](#).

© *Sin Autor*, 1997

Referencias

Cizancourt, M. de, 1951. Grands foraminifères du Paléogène, de l' Eocène inférieur et de l' Eocene moyen du Vénézuéla. *Soc. Geól. France*, Mem. 64, 30(1-2): 1-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Caudri, C. M. B., 1948. Note on the stratigraphic distribution of *LEPIDORBITOIDES*. *Jour. Paleont.*, 22(4): 473-481.

Cizancourt, M. de, 1948. Quelques grands foraminifères du Maestrichtien et de l' Eocene de Vénézuéla. *Soc. Geól. France*, Bull., 5e. sér., 18: 670-674.

Cizancourt, M. de y Frizzell, D. L., 1949. *FERAYINA* in the Middle Eocene of Venezuela (Foraminifera, Rotaliidae, Chapmanininae). *Jour. Paleont.*, 23(5): 496-497.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 1-728.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente*, 3: 33

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela *Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.*, 30(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)