

TERCIARIO (Paleoceno)

Estado Anzoátegui

Esta zona fue definida por Hedberg y Pyre (1944) en la Formación Vidoño. Autores más recientes (Bolli, 1957-b; Stanley, 1960; Renz, 1962; Lamb, 1964-b) aplicaron zonaciones a base de foraminíferos planctónicos en la Formación Vidoño y el término ha caído en desuso.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *GLOBIGERINA* and *GLOBOROTALIA* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(4): 111-123.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of the Santa Anita group and overlying Merecure Group, Rio Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 5(4): 89-108.

Stanley, D. F., 1960. Stratigraphy and foraminifera of Lower Tertiary Vidoño Shale, near Puerto La Cruz, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 44(5): 616-627.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cushman, J. A., 1947. A foraminiferal fauna from the Santa Anita formation of Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 23(1): 1-18.

Hedberg, H. D., 1960. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Liddle, R. A., 1946. The geology of Venezuela and Trinidad, 2nd. ed., *Paleont. Res. Inst.*, ItHaca, New York, 890 p.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)