




TERCIARIO (Plioceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. M. Bolli, 1966, p. 24.

Bolli y Bermúdez (1965) habían establecido la Zona de *Globoquadrina altispira altispira*/*Globorotalia crassaformis* en la Formación Cubagua, con sección tipo en la parte superior del pozo

Cubagua-1 en la isla de Cubagua, Estado Nueva Esparta; la zona se caracteriza por la presencia concomitante de las dos especies citadas. Bolli (1966) abrevió el nombre de la zona a *Globoquadrina altispira altispira*.

Los autores mencionados señalaron su edad Mioceno Tardío. Sin embargo, estudios más recientes (Cati *et al.*, 1968) indican que la mayor parte de la Zona de *Globorotalia margaritae*, infrayacente, corresponde al Plioceno, como también la zona en referencia.

Referencias

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)