

TERCIARIO (Plioceno Tardío)

Jamaica

Referencia original: H. M. Bolli y P. J. Bermúdez, 1965, p. 133-134.

Esta zona fue establecida en Jamaica por Bolli y Bermúdez (1965) y retenida por Bolli (1966) en su esquema de zonación mundial. En Venezuela, se presume que corresponde al hiato que se presenta entre las formaciones Cubagua y Cumaná, ya que no ha sido reconocida. Cati *et al.* (1968) indicaron que la zona ocupa los niveles superiores del Plioceno.

Referencias

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)