




TERCIARIO (Eoceno Tardío)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-d, p. 159-160.

La zona superior extrema de la sección del Eoceno en Trinidad fue nombrada Zona de *Globorotalia cocoaensis* por Bolli (1957-d). Lamb (1964-a, b) la reconoció con el mismo nombre en la parte

superior de la Formación Caratas de Venezuela oriental.

Posteriormente, Bolli (1959) reconoció que el sinónimo *Globorotalia cerroazulensis* tiene prioridad de publicación sobre el término *G. cocoaensis* y modificó el nombre de la zona en este sentido (1959, Cuadro I; 1966). Renz (1962) la incluyó dentro de su Zona de *Globorotalia centralis* en la Formación Tinajitas.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I.U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Bolli, H. M., 1959. Planktonic Foraminífera from the Cretaceous of Trinidad, *B.W.I., Bull. Am. Paleontol.*, 39: 257-277.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 9(1): 3-32.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogeras*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Aoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(4): 111-123.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)